

ABOCA Libramed Fitomagra 138 tabletek



Cena: 156,03 zł

Opis słownikowy

| | |
|--------------|--------------------------|
| Czas dostawy | 2-5 dni |
| Opakowanie | 138 tabletek |
| Postać | Tabletka |
| Producent | ABOCA POLSKA SP. Z O.O. |
| Rejestracja | Wyrób medyczny leczniczy |
| Zastosowanie | Kontrola wagi |

Opis produktu

Libramed w połączeniu ze zrównoważoną dietą, prawidłowym przyjmowaniem płynów oraz regularną aktywnością fizyczną wskazany jest do kontroli wagi u dorosłych i dzieci powyżej 8 roku życia.

Libramed, dzięki Policaptil Gel Retard®, działa na poziomie jelita, tworząc żel o wysokiej lepkości, który ułatwia kontrolę poposiłkowego szczytu glikemicznego, zmniejszając ilość i prędkość wchłaniania węglowodanów (efekt retard).

Wpływa to także na zmniejszenie uczucia głodu i senności poposiłkowej. Ponadto, wykorzystując ten sam mechanizm działania, Policaptil Gel Retard® ogranicza wchłanianie tłuszczów, wspomaga pasaż jelitowy i reguluje konsystencję stolca.

Sposób użycia

Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia -3 tabletki przed dwoma głównymi posiłkami

Dzieci między 8 a 12 rokiem życia -2 tabletki przed dwoma głównymi posiłkami .

Zażycie zalecaną dawkę, popijając pełną szklanką wody i połykając po jednej tabletkę na raz. Nie żuć i nie rozgryzać tabletki. Osoby mające problemy z połykaniem mogą rozpuścić tabletki Libramed w letniej wodzie lub w herbatkach ziołowych niesłodzonych, mieszając do ich całkowitego rozpuszczenia. Uzyskany napój należy spożyć w ciągu kilku minut, zanim zamieni się w żel. Zaleca się przyjęcie produktu przynajmniej 2 godziny przed lub po zażyciu leków, aby nie zaburzyć ich wchłaniania.

Skład

Opatentowany kompleks makrocząsteczek polisacharydowych (Policaptil Gel Retard®)

Aromaty pomarańczowe, jabłkowe i cytrynowe.

Ważne

Okres ważności dotyczy produktu zamkniętego i właściwie przechowywanego.

Ostrzeżenia

Nie zażywać w okresie ciąży i karmienia piersią. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub alergii na jeden lub więcej składników.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła i światła. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.