

## Acard 0,075g 60 tabl.



Cena: 21,09 zł

### Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	0,075 g
Opakowanie	60 tabletek (2 blist. po 30 tabl.)
Postać	tabletki dojelitowe
Producent	WARSZAWSKIE ZAKŁ. FARM. POLFA S.A.
Rejestracja	Lek OTC
Substancja czynna	Acidum acetylsalicylicum

### Opis produktu

#### Skład:

Substancja czynna: kwas acetylosalicylowy. Jedna tabletkę zawiera 75mg kwasu acetylosalicylowego oraz substancje pomocnicze: celuloza sproszkowana, skrobia kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa; otoczka: hypromeloza, kopolimer kwasu metakrylowego typ C, talk, tytanu dwutlenek (E171), krzemionka koloidalna bezwodna, sodu wodorowęglan, sodu laurylosiarczan, trietylu cytrynian, emulsja antypienna.

#### Działanie:

Acard to preparat działający na bazie kwasu acetylosalicylowego. Substancja czynna wspomaga funkcjonowanie systemu sercowo-naczyniowego. Działa przeciwagregacyjnie i efektywnie zabezpiecza przed zlepianiem się płytek krwi (których konsekwencją były zakrzepy i zatory naczyń krwionośnych). W efekcie ogranicza ryzyko m.in. zawału, zarostowej miażdżycy tętnic obwodowych. ACARD ma postać tabletek przeznaczonych do stosowania doustnego.

#### Przeciwwskazania:

- nadwrażliwość na składniki leku
- choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy
- zaburzenia wydolności nerek, wątroby
- skaza krwotoczna
- ataki astmy aspirynowej, które mają związek ze stosowaniem salicylanów bądź składników o zbliżonym działaniu, przede wszystkim NLPZ
- ostatni trymestr ciąży
- jednoczesne stosowanie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych,
- stosowanie u dzieci poniżej 12 lat z infekcjami o charakterze wirusowym

#### Wskazania:

Stosować lek przy objawach choroby niedokrwiennej serca oraz innych schorzeniach i stanach w których zalecane jest przeciwdziałanie zlepianiu się trombocytów krwi (np. przeżyty udar zatorowy mózgu, zarostowa miażdżycza tętnic obwodowych, przeżyty zawał).

**Dawkowanie:**

Stosować doustnie. W przypadku podejrzenia świeżego zawału należy zażyć 4 tabl. jednorazowo (rozgryzając je). Zazwyczaj w celu zapobiegania zdarzeniom układu sercowo-naczyniowego (np. zakrzepicy żyłnej i zatoru płuc, zatorów naczyń mózgowych i napadów TIA, zarostowej miażdżycy tętnic obwodowych, zawału serca), a także po wszczępieniu pomostów aortalno - wieńcowych, angioplastyce wieńcowej zaleca się przyjmowanie 1 tabl./24h.