

Acidolac® baby 1,5 g x 10 sasz.



Cena: 38,76 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Opakowanie	10 sasz. po 1,5 g
Postać	liof.
Producent	MEDANA PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA
Rejestracja	Suplement diety
Substancja czynna	bifidobacterium bb-12, fruktooligosacharydy

Opis produktu

Składniki Acidolac Baby:

Maltodekstryna, fruktooligosacharydy (FOS), liofilizowane bakterie kwasu mlekowego Bifidobacterium BB-12®, substancja przeciwbrylająca mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych.

Zawartość składników w jednej saszetce/w dwóch saszetkach: liofilizowane bakterie kwasu mlekowego Bifidobacterium BB-12® – 4mld CFU/8mld CFU, fruktooligosacharydy – 0,5g/1g.
CFU – jednostka tworząca kolonię.

Działanie Acidolac Baby:

W składzie suplementu diety Acidolac Baby zawarto liofilizowane bakterie kwasu mlekowego Bifidobacterium BB-12® oraz fruktooligosacharydy (FOS). Dzięki połączeniu probiotyku i prebiotyku zasiedlanie jelit przez bakterie kwasu mlekowego jest łatwiejsze, a ponadto czas ich przeżywania jest dłuższy. Preparat jest polecany do stosowania u najmłodszych w okresie antybiotykoterapii i po jej zakończeniu. Uzupełnianie mikrobiomu jelitowego może być również pomocne w przypadku podróży ze zmianą strefy klimatycznej.

Zastosowanie:

Suplement diety Acidolac Baby przeznaczony do stosowania w celu uzupełnienia codziennej diety w bakterie kwasu mlekowego Bifidobacterium BB-12 oraz we fruktooligosacharydy.

Informacje dodatkowe:

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut, czyli zamiennik zróżnicowanej diety. Zachowanie zrównoważonego sposobu żywienia i zdrowego trybu życia ma duże znaczenie. Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła. Nie ma konieczności przechowywania w lodówce. Produkt bezglutenowy. Nie zawiera laktozy i białka mleka krowiego (odpowiedni dla osób z nietolerancją tych składników).

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik suplementu diety.

Sposób użycia Acidolac Baby:

Zalecana dzienna porcja: 1-2 saszetki. Zawartość należy podawać bezpośrednio do ust. Można ją również rozpuścić w niewielkiej ilości płynu o temperaturze do 37st.C. U dzieci karmionych piersią preparat należy rozpuścić w niewielkiej ilości uprzednio ściągniętego

pokarmu. Spożyć od razu po przygotowaniu. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.