


Adrimax syrop 0,03 g/5ml 120ml



Cena: 31,30 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	0,03 g/5ml
Opakowanie	120 ml (but.)
Postać	syrop
Producent	ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Rejestracja	Lek OTC
Substancja czynna	Levodropropizynum

Opis produktu

Skład

Substancją czynną leku jest lewodropropizyna. 5 ml syropu zawiera 30 mg lewodropropizyny.

Pozostałe składniki to: kwas cytrynowy jednowodny, sodu wodorotlenek, sacharoza, aromat malinowy, woda oczyszczona, azot z niską zawartością tlenu.

Aromat malinowy zawiera: substancję aromatyzującą, preparat aromatyzujący, naturalną substancję aromatyzującą, glikol propylenowy (E1520), etanol.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub wg zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie u dzieci w wieku powyżej 2 lat

Masa ciała 10-20 kg: zalecana dawka to 3 ml syropu 3 razy na dobę.

Masa ciała 20-30 kg: zalecana dawka to 5 ml syropu 3 razy na dobę.

Stosowanie u dorosłych

Zalecana dawka to 10 ml syropu do 3 razy na dobę.

Nie należy stosować leku Adrimax dłużej niż 7 dni bez konsultacji z lekarzem.

Działanie

Produkt leczniczy Adrimax hamuje kaszel o różnym pochodzeniu, jak np. kaszel w przebiegu raka płuca, kaszel związany z zakażeniami górnych i dolnych dróg oddechowych czy krztusiec.

Wskazania

Lek Adrimax wskazany jest w objawowym leczeniu nieproduktywnego (suchego) kaszlu.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować:

Jeśli pacjent ma uczulenie na lewodropropizynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Jeśli u pacjenta występuje obfita wydzielina oskrzelowa, stan charakteryzujący się dużą produkcją śluzu (flegmy);

Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności rzęsek nabłonka oskrzelowego charakteryzujące się zmniejszoną zdolnością do wydalania śluzu (zespół Kartagenera, dyskineza rzęsek);

U kobiet w ciąży i karmiących piersią (patrz punkt „Cięża i karmienie piersią”).

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać stosowanie leku Adrimax i natychmiast zwrócić się po pomoc medyczną, jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek z niżej wymienionych objawów:

Ciężkie reakcje skórne (pokrzywka, świąd) lub choroby skóry np. przebiegające z tworzeniem się pęcherzy (epidermoliza);

Nierówna praca serca (ryzyko wystąpienia arytmii);

Reakcja alergiczna i (lub) anafilaktyczna, w postaci obrzęku, duszności, wymiotów i biegunki;

Niebezpiecznie niskie stężenie cukru we krwi, które prowadzi do utraty przytomności (śpiączka hipoglikemiczna).

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

Pokrzywka, rumień, osutka, świąd, reakcje skórne, ciężka reakcja alergiczna objawiająca się obrzękiem twarzy, ust, krtani i gardła (obrzęk naczynioruchowy);

Bóle żołądka, bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka;

Reakcje alergiczne, w tym natychmiastowe, ogólne złe samopoczucie;

Zawroty głowy, zaburzenia równowagi, drżenia, mrowienie, drętwienie;

Kołatanie serca, szybkie bicie serca, niskie ciśnienie krwi;

Drażliwość, senność, depersonalizacja (zaburzenie postrzegania własnej osoby i otoczenia);

Duszność, kaszel, obrzęk błony śluzowej układu oddechowego;

Niedobór lub brak siły (osłabienie) i osłabienie kończyn dolnych.

Ponadto wystąpiły następujące działania niepożądane:

Zapalenie języka i aftowe zapalenie jamy ustnej z gorączką;

Stan zapalny spowodowany zatrzymaniem odpływu żółci z wątroby (cholestatyczne zapalenie wątroby);

Przypadki uogólnionego obrzęku, omdleń i osłabienia;

Napady padaczki - duży napad padaczkowy (drgawki kloniczno-toniczne) oraz mały napad padaczkowy (bezdrżawkowy, tzw. napad typu petit mal);

Rozszerzenie źrenic oraz utrata zdolności widzenia. W obu przypadkach objawy ustąpiły po odstawieniu leku.

Obrzęk powiek, który najczęściej można uznać za obrzęk naczynioruchowy biorąc pod uwagę jednoczesne wystąpienie pokrzywki.

Senność, obniżenie napięcia mięśni oraz wymioty u noworodka, co przypisano przedostaniu się do organizmu dziecka lewodropropizyny przyjmowanej przez karmiącą piersią matkę.

Objawy te pojawiły się po karmieniu piersią i ustąpiły spontanicznie po ominięciu kilku karmień (piersią).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Adrimax należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. Adrimax jest lekiem stosowanym w objawowym leczeniu nieproduktywnego (suchego) kaszlu i można go stosować tylko w oczekiwaniu na rozpoznanie przyczyny kaszlu i (lub) efekt leczenia choroby powodującej ten kaszel.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania lewodropropizyny u osób w podeszłym wieku, ponieważ istnieją dowody zmiany wrażliwości na wiele leków w tej grupie pacjentów.

Zaleca się ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 35 ml/min.).

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedo-