

Aescin 0,02g 30 tabl.powl.



Cena: 27,47 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	0,02 g
Opakowanie	30 tabl. (1 blist. po 30 tabl.)
Postać	tabletki powlekane
Producent	TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
Rejestracja	
Substancja czynna	Escinum

Opis produktu

Skład:

Substancją czynną leku jest alfa-escyna 20 mg a-escyny.

Inne składniki:

laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, powidon, talk, magnezu stearynian.

Otoczka: talk, tytanu dwutlenek, powidon, polisorbát 80, kopolimer kwasu metakrylowego, sodu karboksymetyloceluloza, żółcień pomarańczowa, silikonowa emulsja przeciwwapienna.

Działanie:

Preparat o działaniu przeciwobrzękowym, przeciwzapalnym i chroniącym naczynia żyłne. Zawiera mieszaninę saponin z nasion kasztanowca. Normalizuje przepuszczalność błony naczyń włosowatych, uszczelnia śródbłonek kapilarów, zmniejsza przesiek limfy, poprawia krążenie limfatyczno-żylne, zapobiega zastojowi krwi w żyłkach kończyn dolnych, przyspiesza wchłanianie krwiaków pourazowych i chroni przed ich powstawaniem. Jest skuteczny w zwalczaniu obrzęków pooperacyjnych. W przeciwieństwie do innych wyciągów z kasztanowca wykazuje znikome działanie hemolityczne.

Wskazania:

Zapobieganie i leczenie obrzęków, krwiaków pourazowych, i pooperacyjnych, zaburzenia krążenia żylnego w kończynach dolnych, żylaki kończyn dolnych, bóle kręgosłupa u chorych z objawami ucisku korzeni nerwów rdzeniowych odcinka szyjnego kręgosłupa.

Dawkowanie:

Doustnie: zazwyczaj 0,04 g/dawkę 3 razy dziennie, po posiłku, popijając dużą ilością płynów. Podtrzymująco - 0,02 g/dawkę 2-3 razy dziennie.