

# Aleric Deslo roztwór doustny 0,5g/ml 60ml



Cena: 29,69 zł

## Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	0, 5 mg/ml
Opakowanie	60 ml (but.)
Postać	roztwór doustny
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek OTC
Substancja czynna	Desloratadinum

## Opis produktu

### Skład Aleric Deslo Active 0,5g/ml roztwór doustny:

Substancja czynna: desloratadyna. 1ml roztworu zawiera 0,5mg desloratadyny oraz substancje pomocnicze: cytrynian sodu, sorbitol ciekły, sukraloza, kwas cytrynowy, glikol propylenowy, hypromeloza 2910, aromat tutti frutti płynny, woda oczyszczona.

### Działanie Aleric Deslo Active 0,5g/ml roztwór doustny:

Substancją czynną leku jest desloratadyna. Produkt leczniczy Aleric Deslo Active 0,5mg/ml ułatwia kontrolę nad reakcją alergiczną oraz nad jej objawami. Preparat łagodzi takie objawy jak kichanie, wydzielina z nosa, swędzenie nosa i podniebienia, łzawienie i zaczerwienienie oczu, pokrzywka, świąd. Lek nie wywołuje uczucia senności.

### Zastosowanie Aleric Deslo Active:

Produkt leczniczy Aleric Deslo Active 0,5g/ml roztwór doustny wskazany do stosowania w łagodzeniu objawów alergii – alergicznego zapalenia śluzówki nosa (zapalenie śluzówki nosa wywołane uczuleniem np. katarzem siennym lub uczuleniem na roztocza), pokrzywki (stan skóry wywołany uczuleniem). Do stosowania u dorosłych oraz dzieci powyżej 6. roku życia.

### Informacje dodatkowe:

Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła. Możliwość zastosowania leku u kobiet w ciąży i matek karmiących oraz u osób z zaburzeniami czynności nerek należy skonsultować z lekarzem, jednakże stosowanie w okresie ciąży i laktacji nie jest zalecane. Podczas stosowania leku należy ograniczyć spożywanie alkoholu. Lek zawiera sorbitol, należy skonsultować z lekarzem możliwość zastosowania leku u osób ze stwierdzoną nietolerancją niektórych cukrów.

### Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku, a także na loratadynę. Nie stosować u dzieci poniżej 6. roku życia.

### Działania niepożądane Aleric Deslo Active:

Podczas stosowania leku u niektórych osób mogą wystąpić działania niepożądane. Często: zmęczenie, suchość w jamie ustnej, ból

głowy. Bardzo rzadko: ciężkie reakcje alergiczne, wysypka, kołatanie oraz nieregularne bicie serca, szybkie bicie serca, bóle brzucha, nudności (mdłości), wymioty, rozstrój żołądka, biegunka, zawroty głowy, senność/bezsenność, bóle mięśni, omamy, drgawki, niepokój z nadmierną aktywnością ruchową, zapalenie wątroby, nieprawidłowości w testach czynności wątroby. Częstość nieznana: nietypowe osłabienie, zażółcenie skóry i/lub gałek ocznych, zwiększona wrażliwość skóry na słońce, nawet w przypadku zachmurzenia słońca, zmiana w sposobie bicia serca, nietypowe zachowanie, zwiększony apetyt, zwiększenie masy ciała. U dzieci: częstość nieznana: wolne bicie serca, zmiana w sposobie bicia serca, nietypowe zachowanie, zachowania agresywne, zwiększony apetyt, zwiększenie masy ciała.

**Dawkowanie roztworu doustnego:**

Stosować zgodnie z zaleceniami na ulotce lub według wskazówek lekarza. Przyjmować doustnie. Można stosować niezależnie od posiłków, popić wodą. Dzieci od 6. do 11. roku życia: 5 ml raz na dobę (jedna miarka). U dzieci z nadwagą lub niedowagą może być konieczne dostosowanie dawki po konsultacji z lekarzem. Młodzież powyżej 12. roku życia, dorośli: 10ml raz na dobę (dwie miarki). Do odmierzania można również używać specjalnej strzykawki, która może być dołączona do opakowania. W przypadku braku poprawy lub nasilenia objawów zaleca się skonsultować z lekarzem.