

Allegra 0,12g 20 tabl.

Cena: 38,97 zł



Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	120 mg
Opakowanie	20 tabletek
Postać	tabletki powlekane
Producent	SANOFI AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH
Rejestracja	Lek OTC
Substancja czynna	Fexofenadinum

Opis produktu

Składniki Allegra 120mg:

Substancja czynna: feksofenadyny chlorowodorek (Fexofenadini hydrochloridum). Jedna tabletki zawiera 120mg feksofenadyny chlorowodoru oraz substancje pomocnicze: rdzeń tabletki – kroskarmeloza sodowa, skrobia kukurydziana żelowana, celuloza mikrokryształiczna, magnezu stearynian; otoczka – hypromeloza E-15, hypromeloza E-5, powidon, tytanu dwutlenek (E171), krzemionka koloidalna bezwodna, makrogol 400, mieszanina tlenków żelaza (E172).

Działanie Allegra 120mg:

Przeciwalergiczny lek wskazany do stosowania w przypadku występowania objawów sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej (katar sienny). Produkt leczniczy Allegra 120mg łagodzi takie objawy jak: kichanie, swędzenie i uczucie zatkanego nosa, katar, zaczerwienienie oraz łzawienie oczu. Lek zawiera feksofenadyny chlorowodorek, czyli substancję czynną o działaniu przeciwhistaminowym. Preparat do stosowania u osób dorosłych oraz dzieci od 12. roku życia.

Zastosowanie:

Produkt leczniczy Allegra 120mg wskazany do stosowania w leczeniu objawów sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (katar sienny): kichania, swędzenia nosa, kataru, uczucia zatkanego nosa, zaczerwienienia i łzawienia oczu. Lek przeznaczony dla osób dorosłych i dzieci powyżej 12. roku życia.

Informacje dodatkowe:

Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła. Stosowanie w okresie ciąży i karmienia piersią; nie jest zalecane przyjmowanie leku przez kobiety w ciąży i matki karmiące.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku.

Działania niepożądane:

Podczas stosowania leku u niektórych osób mogą wystąpić działania niepożądane. W przypadku wystąpienia następujących objawów należy przerwać stosowanie leku i natychmiast zgłosić się po pomoc lekarską: obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła i trudności w

oddychaniu (mogą to być symptomy ciężkiej reakcji alergicznej). Inne działania niepożądane występujące: często: bóle głowy, senność, nudności oraz zawroty głowy; niezbyt często: zmęczenie, senność; częstość nieznana: trudności w zasypianiu (bezsenna), zaburzenia snu, koszmary senne, wyraziste sny, nerwowość, przyspieszona lub nieregularna czynność serca, biegunka, wysypka skórna, świąd, pokrzywka, ciężkie reakcje alergiczne (mogą powodować obrzęk twarzy, warg, języka i gardła, trudności w oddychaniu, uczucie ucisku w klatce piersiowej, nagłe zaczerwienienie skóry).

Dawkowanie tabletek Allegra 120mg:

Stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Osoby dorosłe, dzieci od 12. roku życia: stosować jedną tabletkę na dobę. Tabletki przyjmować przed posiłkiem, popijać wodą. W przypadku, gdy po 5 dniach leczenia objawy nie ustępują, należy skonsultować się z lekarzem.