

Altazija żel 0,01 g/g 75g



Cena: 9,26 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	0,01 g/g
Opakowanie	75 g (tub.)
Postać	żel
Producent	ZIAJA LTD. Z.P.L. SP. Z 0.0.
Rejestracja	Lek OTC
Substancja czynna	Alumini acetotartras

Opis produktu

Składniki:

Substancja czynna – octanowinian glinu (1g żelu zawiera 10mg substancji czynnej) oraz substancje pomocnicze: mentol, etylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, etanol 96%, karbomer, trietanolamina, woda oczyszczona.

Działanie:

Octanowinian glinu jest substancją czynną o działaniu ściągającym oraz przeciwobrzękowym, właściwości te sprzyjają łagodzeniu objawów stłuczeń i obrzęków pourazowych. Dodatkowo produkt leczniczy Altazija zawiera mentol, który wykazuje działanie chłodzące, a tym samym zmniejsza ból w obrębie ogniska zapalnego.

Zastosowanie:

Produkt leczniczy Altazija 10 mg/g żel wskazany do miejscowego stosowania w przypadku stłuczeń, obrzęków pourazowych oraz stawowych, a także przy oparzeniach pierwszego stopnia.

Informacje dodatkowe:

Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej. W przypadku kobiet w ciąży oraz matek karmiących konieczna jest konsultacja lekarska. Unikać kontaktu z oczami oraz błonami śluzowymi (gdy dojdzie do takiego kontaktu, należy obficie przemywać wodą). Zawartość etylu parahydroksybenzoesanu oraz propylu parahydroksybenzoesanu w leku może być przyczyną reakcji alergicznych (możliwe reakcje typu późnego).

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik żelu. Nie stosować na rozległych, otwartych ranach, na skórze zakażonej lub zmienionej chorobowo. Nie stosować u dzieci poniżej 3. roku życia.

Działania niepożądane:

Podczas stosowania żelu Altazija mogą wystąpić niepożądane działania w postaci miejscowych reakcji skórnych. Intensywne aplikacje mogą spowodować macerację skóry. W przypadku osób nadwrażliwych mogą pojawić się odczyny: ziarninowe, rumieniowe, grudkowe. U osób z ciężką niewydolnością nerek istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia objawów hiperaluminemii oraz hipofosfatemii.

Sposób użycia:

Stosować miejscowo, zaleca się stosować zgodnie ze wskazówkami na ulotce bądź wskazówkami lekarza. Aplikować na bolące miejsca niewielką ilość żelu, zaleca się stosować w postaci okładów. Częstotliwość aplikacji: 3-4 razy na dobę. W przypadku braku poprawy należy zwrócić się o pomoc do lekarza.