

Alugastrin 3 FORTE 30 tabl.



Cena: 42,40 zł

Opis słownikowy

| | |
|--------------|-----------------------------------|
| Czas dostawy | 2-5 dni |
| Opakowanie | 30 tabletek |
| Postać | tabletki |
| Producent | LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ SP. Z O.O. |
| Rejestracja | Wyrób medyczny leczniczy |

Opis produktu

Skład Alugastrin 3 Forte:

Mucosave (ekstrakt z liści Opuncji Figowej i liści Oliwki Europejskiej), alginian sodu, węglan wapnia, hydroksypropylometylceluloza, celuloza mikrokrystaliczna, stearynian magnezu, krzemionka.

Działanie Alugastrin 3 Forte:

Produkt do stosowania w celu łagodzenia objawów refluksu, zgagi i niestrawności. Wyrób medyczny Alugastrin 3 Forte zawiera w swoim składzie unikalny kompleks Mucosave, który tworzą ekstrakty z liści opuncji figowej oraz z liści oliwki europejskiej. Formułę uzupełnia alginian sodu oraz węglan wapnia. Taki skład zapewnia potrójne działanie preparatu. Po pierwsze wyrób przeciwdziała przedostawaniu się kwasów żołądkowych w stronę przełyku (alginian sodu). Po drugie przyczynia się do obniżenia nadkwaśności żołądka (węglan wapnia). Po trzecie działa ochronnie na śluzówkę żołądka i przełyku, zabezpieczając ją przed drażniącym działaniem zgagi oraz zarzucanej kwaśnej treści żołądka (kompleks Mucosave).

Zastosowanie:

Wyrób medyczny Alugastrin 3 Forte przeznaczony do stosowania w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego w celu łagodzenia takich objawów jak np. zgaga, bóle żołądka, refluksowe zapalenie przełyku, zarzucanie kwaśnej treści żołądka, problemy z trawieniem, kaszel, zapalenie krtani i gardła.

Informacje dodatkowe:

Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła. Możliwość zastosowania produktu u dzieci poniżej 12. roku życia, u kobiet w okresie ciąży i laktacji należy skonsultować z lekarzem. Ze względu na zawartość sodu osoby z nadciśnieniem, niewydolnością nerek lub serca powinny zachować ostrożność podczas stosowania leku.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu.

Sposób użycia tabletek Alugastrin 3 Forte:

Do stosowania doustnego. Zaleca się stosować jedną tabletkę wieczorem przed pójściem spać. W razie konieczności można zastosować drugą tabletkę w ciągu dnia po posiłku. Tabletki popijać wodą. Nie przekraczać zalecanego dziennego dawkowania. Maksymalny czas leczenia: 30 dni.