

Amertil Bio 0,01g 10 tabl. powl.



Cena: 14,82 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	, 01 g
Opakowanie	10 tabletek (blist.)
Postać	tabletki powlekane
Producent	BIOFARM SP.Z O.O.
Rejestracja	Lek OTC
Substancja czynna	Cetirizinum

Opis produktu

Skład Amertil Bio 0,01g:

Substancja czynna: cetyryzyny dichlorowodorek. Jedna tabletkę zawiera 10mg cetyryzyny dichlorowodoru oraz substancje pomocnicze: rdzeń tabletki – laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana, krospowidon, magnezu stearynian, skład otoczki – hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171), makrogl 400.

Działanie Amertil Bio 0,01g:

Cetyryzyny dichlorowodorek to substancja czynna o działaniu przeciwalergicznym. Produkt leczniczy Amertil Bio 0,01g wskazany jest do stosowania u osób dorosłych oraz dzieci powyżej 6. roku życia. Lek łagodzi objawy dotyczące nosa i oczu, które występują w przebiegu sezonowego lub przewlekłego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. Preparat można także stosować w celu łagodzenia objawów związanych z przewlekłą pokrzywką idiopatyczną.

Zastosowanie Amertil Bio:

Produkt leczniczy Amertil Bio 0,01g wskazany do stosowania w objawowym leczeniu sezonowego i przewlekłego alergicznego zapalenia śluzówki nosa oraz w objawowym leczeniu pokrzywki.

Informacje dodatkowe:

Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła. Lek może wpływać na wynik alergicznych testów skórnych. Lek zawiera laktozę, osoby ze stwierdzoną nietolerancją niektórych cukrów powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu. Osoby z niewydolnością nerek, z problemem z oddawaniem moczu, padaczką lub istniejącym ryzykiem wystąpienia drgawek powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu.

Przeciwwskazania do stosowania leku Amertil Bio:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku, hydroksyzynę lub pochodne piperazyny. Nie stosować u dzieci poniżej 6. roku życia. Nie stosować w okresie ciąży i laktacji. Nie stosować w przypadku ciężkiej choroby nerek (ciężkie zaburzenia czynności nerek z kliresem kreatyniny mniejszym niż 10ml/min..

Działania niepożądane:

Podczas stosowania leku u niektórych osób mogą wystąpić działania niepożądane. Często: senność, zawroty głowy, bóle głowy, zapalenie gardła, zapalenie błony śluzowej nosa, biegunka, nudności, suchość w jamie ustnej, zmęczenie. Niezbyt często: pobudzenie, zaburzenie czucia, ból brzucha, świąd, wysypka, astenia, złe samopoczucie. Rzadko: reakcje alergiczne, czasami ciężkie, depresja, omamy, zachowanie agresywne, dezorientacja, bezsenność, drgawki, tachykardia, nieprawidłowa czynność wątroby, pokrzywka, obrzęki, zwiększenie masy ciała. Bardzo rzadko: małopłytkowość, skurcze nawykowe, omdlenie, drżenie, zaburzenia smaku, niewyraźne widzenie, obrzęk naczynioruchowy, zaburzenia oddawania moczu.

Dawkowanie Amertil Bio 0,01g:

Należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub według wskazówek na ulotce. Tabletkę połykać, popijać dużą ilością wody (około szklanki). Osoby dorosłe, młodzież powyżej 12. roku życia: jedna tabletkę raz na dobę. Dzieci od 6. do 12. roku życia: po pół tabletki dwa razy na dobę.