

# Anaketon 125 syrop 150ml



Cena: 43,84 zł

## Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Opakowanie	150 ml
Postać	syrop
Producent	VITIS PHARMA
Rejestracja	Suplement diety

## Opis produktu

### Składniki:

Woda, ekstrakt wodnoglicerynowy z rumianku (*Matricaria chamomilla* L., kwiaty), (substancja konserwująca: sorbinian potasu), ekstrakt wodnoglicerynowy z imbiru (*Zingiber ocinale* Rosc., kłącze) (stabilizator: glicerol, substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoosan sodu), L-alanina, substancja konserwująca: sorbinian potasu; ryboflawina (witamina B2), chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), substancja zagęszczająca: guma ksantanowa; regulator kwasowości: kwas cytrynowy; chlorowodorek tiaminy (witamina B1), substancja słodząca: sukraloza. Zawiera substancje słodzące.

Zawartość składników w 10ml/w 20ml: L-alanina – 55mg/110mg, ekstrakt z rumianku – 375mg/750mg, ekstrakt z imbiru – 125mg/250mg, witamina B6 – 9mg (643% RWS)/18mg (1286% RWS), witamina B1 – 6,75mg (614% RWS)/13,5mg (1227% RWS), witamina B12 – 8,25mg (589% RWS)/16,5mg (1178% RWS).

RWS – referencyjna wartość spożycia.

### Działanie:

Syrop polecany do stosowania wspomagająco w łagodzeniu dyskomfortu trawiennego u dzieci powyżej 3. roku życia oraz u dorosłych, w tym także u kobiet w okresie ciąży. Suplement diety Anaketon 125 syrop zawiera rumianek, który wspiera trawienie oraz imbir, który wspomaga prawidłową pracę przewodu pokarmowego, dodatkowo pomaga utrzymać dobre samopoczucie podczas podróży. Witaminy z grupy B wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego.

Suplement diety Anaketon 125 syrop przeznaczony do stosowania jako uzupełnienie codziennej diety w składniki pomocne w łagodzeniu dyskomfortu trawiennego, również podczas podróży. Można stosować u dzieci powyżej 3. roku życia oraz u dorosłych, w tym u kobiet w okresie ciąży.

### Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik suplementu diety. Nie stosować u dzieci poniżej 3. roku życia.

### Sposób użycia:

Zalecana dzienna porcja: 10-20ml. Stosować po 10ml 1-2 razy dziennie. Miarką dołączoną do opakowania odmierzyć syrop. Można przyjmować syrop nierozcieńczony lub rozpuszczony w wodzie. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.