


Apap 0,5 g 12 tabl.powl



Cena: 11,69 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	500mg
Opakowanie	12 tabl. (blis.)
Postać	tabletki powlekane
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Rejestracja	
Substancja czynna	Paracetamolum

Opis produktu

Skład:

1 tabletki powlekana zawiera:
substancję czynną: paracetamol 500 mg
substancje pomocnicze:
wosk Carnauba, hypromeloza, makrogol, powidon, skrobia żelowana, kroskarmeloza sodowa, kwas stearynowy.

Działanie:

Apap należy do rodziny leków o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Składnikiem aktywnym leku jest dobrze znany Paracetamol, który pomaga w niwelowaniu bólu głowy, mięśni, zębów oraz bywa pomocny w leczeniu nerwobóli i znoszeniu nadmiernej ciepłoty ciała przebiegu przeziębienia lub grypy.

Zastosowanie:

Apap popularnie stosowany jest jako środek przeciwbólowy w bólach różnego pochodzenia o słabym i umiarkowanym nasileniu oraz jako środek przeciwgorączkowy w przebiegu grypy, przeziębienia.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na paracetamol. Ciężkie upośledzenie czynności wątroby i nerek, niedobór G-6-PD i reduktazy methemoglobinowej. Lek nie powinien być stosowany w I trymestrze ciąży. Preparat w kroplach i zawiesinie nie powinien być stosowany u dzieci poniżej 3 m.ż. U dzieci poniżej 12 r.ż. w postaci tabletek może być stosowany po konsultacji z lekarzem.

Działanie niepożądane:

Sporadycznie: skórne reakcje uczuleniowe (pokrzywka, rumień, zapalenie skóry, plamica barwnikowa). Bardzo rzadko w przypadku osobniczej nadwrażliwości niedokrwiłość hemolityczna, trombocytopenia, agranulocytoza, methemoglobinemia. Stosowany w dużych dawkach lub długotrwale może upośledzić czynność wątroby i/lub nerek.

Interakcje:

Paracetamol nasila działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny (nie wpływa na zmianę czasu krwawienia i

agregację płytek krwi u zdrowych i chorych na hemofilię). Stosowanie z lekami hamującymi rozkład paracetamolu w wątrobie (rifampicyna, leki przeciwpadaczkowe, niektóre leki nasenne) zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby. Stosowany z inhibitorami MAO może wywołać stany pobudzenia i wysoką gorączkę; z lamotryginą lub chloramfenikolem - obniża ich stężenie we krwi. Metoklopramid przyspiesza, a propantelina opóźnia wchłanianie paracetamolu z przewodu pokarmowego; cymetydyna, metyrapon, probenecid, antypiryna, salicylamid, izoniazyd, ranitydyna, propranolol - wydłużają okres półtrwania paracetamolu we krwi.

Dawkowanie:

Lek doustny. Przyjmowanie: dorośli 1-2 tabl. (500-1000 mg) 3-4 razy dziennie. Doraźnie przeciwbólowo lub przeciwgorączkowo jednorazowo 1-2 tabl. (500-1000 mg).