

# Apap Noc 50 tabl.powl



Cena: 53,09 zł

## Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	500mg + 25mg
Opakowanie	50 tabl. (stoik)
Postać	tabletki powlekane
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Rejestracja	
Substancja czynna	diphenhydraminum, Paracetamolum

## Opis produktu

### Skład Apap Noc:

Substancje czynne: paracetamol (Paracetamolum) i difenhydraminy chlorowodorek (Diphenhydramini hydrochloridum). Jedna tabletką zawiera 500mg paracetamolu i 25mg difenhydraminy chlorowodoru oraz substancje pomocnicze – rdzeń tabletki: skrobia żelowana, powidon, krospowidon, kwas stearynowy, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa, magnezu stearynian, skrobia kukurydziana, błękit brylantowy, lak (E 133); otoczka: Opadry Blue YS-1-10524 (hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400, błękit brylantowy, lak (E 133), polisorbat 80, carmina (E 132)); otoczka: otoczka bezbarwna (hypromeloza, makrogol 400, makrogol 8000).

### Działanie Apap Noc:

Lek wskazany do stosowania w leczeniu bólów różnego rodzaju. Produkt leczniczy Apap Noc zawiera paracetamol, który działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo, a także difenhydraminy chlorowodorek, który działa uspokajająco i nasennie. Lek przeznaczony jest do stosowania przed snem, gdyż nie tylko zmniejsza dolegliwości bólowe, ale i ułatwia zasypianie oraz zapobiega nocnym wybudzeniom spowodowanym odczuwaniem bólu.

### Zastosowanie:

Produkt leczniczy Apap Noc wskazany do krótkotrwałego stosowania w leczeniu bólu – bólu głowy, bólów kostno-stawowych, bólu mięśni, bólu zębów, bólów menstruacyjnych, nerwobóli, bólów związanych z przeziębieniem i grypą – bólów, które powodują trudności w zasypianiu. Lek dla osób dorosłych oraz młodzieży powyżej 12. roku życia.

### Informacje dodatkowe:

Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła. Przed rozpoczęciem stosowania leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. Stosowanie leku u osób z niewydolnością wątroby, nadużywających alkoholu oraz głodzonych niesie ryzyko uszkodzenia wątroby. Należy ostrożnie stosować u osób z niewydolnością nerek, zaburzeniami rytmu serca, nadciśnieniem tętniczym, padaczką, myasthenia gravis, nadczynnością gruczołu tarczowego, zwężeniem odźwiernika oraz u osób w podeszłym wieku. Ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby podczas stosowania leku nie wolno pić alkoholu. Lek należy przyjmować wyłącznie przed snem. Stosowanie u dzieci i młodzieży: lek przeciwwskazany do stosowania poniżej 12. roku życia. Stosowanie z innymi lekami: należy skonsultować się z lekarzem; nie należy

stosować równocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol i difenhydraminę; należy omówić z lekarzem możliwość jednoczesnego stosowania tego leku i leków przeciwzakrzepowych (warfaryny i innych pochodnych kumaryny), leków działających depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy (takich jak leki nasenne, uspokajające i opioidowe leki przeciwbólowe), leków neuroleptycznych (stosowanych w stanach nadmiernego pobudzenia), leków przeciwdepresyjnych (fluoksetyna, paroksetyna, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne), leków przeciwdrgawkowych (fenytoina, karbamazepina, fenobarbital) oraz ryfampicyny (antybiotyk stosowany m.in. w leczeniu gruźlicy); z lekarzem lub farmaceutą należy się skonsultować, jeśli stosowania jest flukloksacylina (antybiotyk) – ze względu na poważne ryzyko zaburzenia dotyczącego krwi i płynów ustrojowych (kwasicy metabolicznej z dużą luką anionową). Długotrwałe stosowanie bez nadzoru lekarza może być szkodliwe. Lek zawiera mniej niż 1mmol (23mg) sodu na pojedynczą dawkę (1-2 tabletki), jest uznawany za „wolny od sodu”. Stosowanie z jedzeniem i pić: jedzenie nie zmniejsza wchłaniania leku. Stosowanie w okresie ciąży i karmienia piersią: należy się skonsultować z lekarzem, jednak nie należy stosować tego leku u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: podczas stosowania leku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.

#### **Przeciwwskazania:**

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku. Nie stosować w przypadku takich schorzeń jak: ciężka niewydolność wątroby lub nerek, wirusowe zapalenie wątroby, jaskra, rozrost gruczołu krokowego, porfiria, astma oskrzelowa w fazie zaostrzenia. Nie stosować w trakcie leczenia inhibitorami MAO i w okresie do 2 tygodni od zaprzestania przyjmowania tych leków. Nie stosować u dzieci poniżej 12. roku życia. Nie stosować u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią.

#### **Działania niepożądane:**

Podczas stosowania leku u niektórych osób mogą wystąpić działania niepożądane. Często: senność, zaburzenia uwagi, zawroty głowy; suchość błon śluzowych jamy ustnej, gardła i nosa; rzadko: reakcje nadwrażliwości, tj. pokrzywka, rumień, wysypka (w tym uogólniona), obrzęki; dezorientacja, niepokój; niewyraźne widzenie; tachykardia, arytmia; zaburzenia żołądkowo-jelitowe, nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha, zaburzenia trawienia; świąd, pocenie się; zatrzymanie moczu; bardzo rzadko: niedokrwistość, zahamowanie czynności szpiku kostnego, małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi), agranulocytoza (bardzo znaczne zmniejszenie lub brak krwinek białych), leukopenia (zmniejszenia ilości leukocytów), neutropenia (zmniejszenie ilości granulocytów obojętnochłonnych); obrzęk krtani, obrzęk naczynioruchowy, wstrząs anafilaktyczny (zaburzenia świadomości, niska produkcja moczu, hiperwentylacja, znaczne osłabienie), zespół Stevens – Johnsona (pęcherzowy rumień wielopostaciowy), toksyczna nekroliza naskórka; zawroty głowy; skurcz oskrzeli u pacjentów z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne; krwotok, ostre i przewlekłe zapalenie trzustki; ostre uszkodzenie wątroby występujące najczęściej w wyniku przedawkowania paracetamolu, niewydolność wątroby, martwica wątroby, żółtaczkę, plamica barwnikowa; martwica brodawek nerkowych podczas długotrwałego stosowania; nefropatie, tubulopatie (uszkodzenie nerek).

#### **Dawkowanie tabletek Apap Noc:**

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub według wskazówek na ulotce. Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Stosować wyłącznie przed snem. Zalecana dawka dla dorosłych i dzieci powyżej 16. roku życia: stosować 1-2 tabletki na 30 minut przed snem. Nie należy przyjmować więcej niż 2 tabletki przed snem. Zalecana dawka dla młodzieży od 12. do 15. roku życia: stosować 1 tabletkę na 30 min przed snem. Nie należy przyjmować dawki większej niż zalecana. Bez konsultacji z lekarzem nie stosować dłużej niż 7 dni. Jeśli po 3 dniach objawy nie ustępują lub się nasilają, należy się skonsultować z lekarzem.