


Apap Przeziębienie Junior 6 saszetek



Cena: 29,19 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	0,02g+5mg, 3g+0
Opakowanie	6 saszetek
Postać	proszek do sporządzenia roztworu
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek OTC
Substancja czynna	Acidum ascorbicum, Paracetamolum, phenylephri hydrochloridum

Opis produktu

Skład Apap przeziębienie junior:

Substancje czynne: paracetamol, kwas askorbowy, fenylefryny chlorowodorek. Jedna saszetka zawiera 300mg paracetamolu, 20mg kwasu askorbowego i 5mg fenylefryny chlorowodoru oraz substancje pomocnicze: mannitol (E421), kwas cytrynowy, sodu cytrynian, sodu cyklaminian, sacharyna sodowa, wapnia glukonian, aromat pomarańczowy (olejek pomarańczowy, olejek cytrynowy, alkohol C-12, linalol, alkohol benzylowy, cytronelal, dekstroza, guma arabska, syrop glukozowy z odwodnionej kukurydzy, butylohydroksyanizol), aromat truskawkowy (cis-3-heksenol, furaneol, etylo-2-metyloleśnian, kwas heksanowy, metylu cynamonian, maltol, guma arabska, syrop glukozowy z odwodnionej kukurydzy, krzemu dwutlenek), krzemionka koloidalna bezwodna.

Działanie Apap przeziębienie junior:

Lek złożony do stosowania w objawowym leczeniu grypy i przeziębienia. Produkt leczniczy Apap przeziębienie junior zawiera paracetamol, który działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Ponadto fenylefryna powoduje zmniejszenie obrzęku oraz przekrwienia śluzówki nosa. Skład uzupełnia kwas askorbowy (witamina C). Preparat w postaci proszku do przygotowywania roztworu.

Zastosowanie:

Produkt leczniczy Apap przeziębienie junior wskazany do stosowania (krótkotrwale) w objawowym leczeniu przeziębienia i grypy, które objawiają się gorączką, dreszczami, bólem głowy, bólami mięśniowo-stawowymi, bólem gardła, niedrożnością przewodów nosowych i zatok (ból, nieżyt śluzówki nosa). Do stosowania u osób dorosłych i dzieci powyżej 6. roku życia.

Informacje dodatkowe:

Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła. Lek zawiera dekstrozę (15mg w jednej saszetce) i syrop glukozowy (29,8mg w jednej saszetce) – należy omówić z lekarzem możliwość stosowania w przypadku osób ze stwierdzoną nietolerancją niektórych cukrów; należy to również brać pod uwagę w przypadku osób chorych na cukrzycę. Lek zawiera sód (3,48mmol – 127,8mg w sześciu saszetkach (maksymalna dawka dobową), co odpowiada 6,3% maksymalnej dawki dobowej sodu (według rekomendacji WHO). Lek zawiera alkohol benzylowy, który może wywoływać reakcje alergiczne. Podczas stosowania leku zaleca się zachować ostrożność przy prowadzeniu pojazdów i obsłudze urządzeń mechanicznych. Nie spożywać alkoholu podczas leczenia.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku. Nie stosować w przypadku: niestabilnej choroby wieńcowej, zaburzenia rytmu serca, wysokiego ciśnienia tętniczego, wrodzonego niedoboru niektórych enzymów: dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej lub reduktazy methemoglobinowej, ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek, wirusowego zapalenia wątroby, choroby alkoholowej, jaskry z wąskim kątem przesączenia, anatomicznie wąskiego kąta przesączenia. Nie stosować podczas stosowania leków z grupy inhibitorów MAO, a także w okresie do 2 tygodni od zakończenia ich przyjmowania. Nie stosować równocześnie z zydowudyną. Nie stosować razem z innymi lekami zawierającymi paracetamol lub innymi lekami przeciw grypie, przeziębieniu i lekami zmniejszającymi przekrwienie błony śluzowej (tzw. sympatykomimetyki). Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią. Nie stosować poniżej 6. roku życia.

Działania niepożądane Apap przeziębienie junior:

Podczas stosowania leku u niektórych osób mogą wystąpić działania niepożądane. W przypadku wystąpienia następujących objawów należy przerwać stosowanie leku oraz skonsultować się z lekarzem: reakcje alergiczne – wysypka skórna lub swędzenie skóry, czasem połączone z utrudnionym oddychaniem lub opuchlizną warg, języka, gardła lub twarzy (występują rzadko), ciężkie reakcje skórne – wysypka na całym ciele, nadżerki w jamie ustnej, oczach, narządach płciowych i na skórze, czerwone plamki na tułowiu, często z pęcherzami po środku, pękającymi olbrzymimi pęcherzami, złuszczeniem dużych płatów naskórka, osłabieniem, gorączką i bólami stawowymi (bardzo rzadko), problemy z oddychaniem, jeśli podobne problemy występowały w przeszłości podczas stosowania kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (bardzo rzadko), utrata widzenia, która może być spowodowana nadmiernie wysokim ciśnieniem śródgałkowym szczególnie u osób z jaskrą z zamkniętym kątem przesączenia (rzadko), nietypowe szybkie tętno lub uczucie nieregularnego rytmu serca (częstość nieznana), trudności w oddawaniu moczu (częstość nieznana), żółtaczką, ostre uszkodzenie wątroby występujące najczęściej w wyniku przedawkowania, niewydolności wątroby (na co mogą wskazywać zażółcenie skóry i oczu, tkliwość wątroby), martwica wątroby (bardzo rzadko), hipoglikemia (bardzo rzadko), kwasica metaboliczna z wysoką luką anionową (obniżenie pH krwi spowodowane nagromadzeniem we krwi nadmiernych ilości substancji o charakterze kwaśnym z równoczesnymi zaburzeniami elektrolitowymi) (częstość nieznana), zawroty głowy, przyspieszenie akcji serca, skłonność do występowania siniaków (zahamowanie czynności szpiku kostnego-zmniejszenie liczby komórek szpiku wytwarzających krwinki) i zaburzenia krzepnięcia (rzadko). Inne działania niepożądane występujące: rzadko – depresja, splątanie; drżenie; rozszerzenie źrenic, obrzęki; biegunka, bóle brzucha; zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, nieprawidłowa czynność wątroby; świąd, pocenie się; złe samopoczucie, gorączka, nadmierne uspokojenie; bardzo rzadko – niedokrwistość; leukopenia, neutropenia, agranulocytoza, trombocytopenia; plamica barwnikowa; jałowy ropomocz (mętny moczek); częstość nieznana – lęk, nerwowość, niepokój, omamy; zawroty głowy, ból głowy, bezsenność; podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi; błądność skóry; nudności, wymioty, zaburzenia trawienia, pieczenie w nadbrzuszu, suchość w jamie ustnej, ostre lub przewlekłe zapalenie trzustki.

Dawkowanie saszetek Apap przeziębienie junior:

Lek stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub według zaleceń na ulotce. Można stosować niezależnie od posiłków. Zawartość saszetki należy rozpuścić w 100ml gorącej wody (dobrze wymieszać), wypić w ciągu 15 minut od przygotowania. Zalecana dawka dobową: dzieci od 6. do 12. roku życia – stosować w razie konieczności jedną saszetkę co 4-6 godzin, maksymalnie do 4 saszetek na dobę. Maksymalna dobową dawką paracetamolu u dzieci – 60mg/kg masy ciała na dobę podawana w dawkach podzielonych do 4 razy na dobę po 15mg/kg masy ciała. Zalecana dawka dobową: dorośli i dzieci powyżej 12. roku życia – stosować w razie konieczności 1-2 saszetki co 4-6 godzin, maksymalnie do 6 saszetek na dobę. Bez konsultacji z lekarzem nie stosować dłużej niż przez 3 dni. Jeśli po trzech dniach stosowania leku nie nastąpiła poprawa lub objawy się pogorszyły, należy skonsultować się z lekarzem. U osób z niewydolnością nerek, osób z klirensiem kreatyniny 10-50ml/min, osób z niewydolnością wątroby lub zespołem Gilberta wymagana jest zmiana dawkowania. Nie należy stosować leku (powyżej 2g paracetamolu na dobę) bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem w przypadku osób o masie ciała poniżej 50kg, osób z chorobą alkoholową, osób odwodnionych lub niedożywionych.