

Arnigel żel 120g

Cena: 41,26 zł



Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Opakowanie	120 g
Postać	żel
Producent	BOIRON S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Homeopathic medicinalis product

Opis produktu

Składniki:

100g żelu zawiera: substancja czynna: Arnica MontanaTM – 7g. Substancje pomocnicze: karbomer, sodu wodorotlenek 10%, etanol 96% (V/V), woda oczyszczona.

Działanie:

Wskazaniem do stosowania leku są niewielkie urazy – siniaki i stłuczenia, a ponadto bóle mięśni pojawiające się po intensywnym wysiłku fizycznym. Arnigel żel to homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi. Lek ma postać roll-onu, który zapewnia wygodną, precyzyjną aplikację. Produkt leczniczy Arnigel żel wskazany do stosowania w leczeniu miejscowych następstw niewielkich urazów – siniaków i stłuczeń, a także do stosowania w bólach mięśni, które pojawiają się po intensywnym wysiłku fizycznym.

Informacje dodatkowe:

Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła. Należy zużyć w ciągu 6 miesięcy po otwarciu. Stosowanie z innymi lekami: należy się skonsultować z lekarzem, jeśli stosowane są inne leki. Nie jest zalecane jednoczesne stosowanie z preparatami przeciwzakrzepowymi z grupy antagonistów witaminy K. Stosowanie w okresie ciąży i karmienia piersią: możliwość stosowania leku należy omówić z lekarzem. Lek zawiera etanol – nie należy stosować na błony śluzowe w obrębie twarzy, na oczy, na duże powierzchnie skóry oraz na rany, bez konsultacji z lekarzem nie stosować u dzieci poniżej 12. roku życia.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku.

Działania niepożądane:

Podczas stosowania leku u niektórych osób mogą wystąpić działania niepożądane. W przypadku osób uczulonych na arnikę może wystąpić miejscowa reakcja alergiczna – zaczerwienienie, swędzenie, wypryski, pokrzywka. Ze względu na zawartość alkoholu w przypadku częstego stosowania może dojść do podrażnienia i miejscowego wysuszenia skóry.

Sposób użycia:

Lek stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub według wskazówek na opakowaniu. Stosować na skórę. Zalecana dawka dla osób dorosłych i młodzieży powyżej 12. roku życia: stosować 1-3 razy na dobę. Przed użyciem wstrząsnąć, następnie delikatnie ścisnąć tubkę. Cienką warstwę żelu nanieść na bolesne miejsce, delikatnie wmasować do całkowitego wchłonięcia. Stosować do momentu ustąpienia objawów. W przypadku, gdy po 5 dniach nie nastąpiła poprawa lub doszło do pogorszenia, należy się skonsultować z lekarzem.