

# Ascorutical Forte 20 tabl.powl



Cena: 18,02 zł

## Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Opakowanie	20 tabletek
Postać	tabletki powlekane
Producent	LABORATOIRE CHAUVIN S.A.
Rejestracja	Suplement diety
Substancja czynna	ascorbic acid, Calcium, rutosidum

## Opis produktu

### Składniki:

Węglan wapnia, celuloza mikrokrystaliczna, kwas L-askorbinowy (witamina C), skrobia kukurydziana, rutyna, sól sodowa karboksymetylocelulozy usciciowana, stearynian magnezu, substancje do stosowania na powierzchnię: hydroksypropylometyloceluloza, talk, dimetylopolisiloksan, glikol polietylowy 6000, barwniki: dwutlenek tütanu, żółcień chinolinowa.

1 kapsułka zawiera:

witamina C 80mg - 100% ZDS

wapń - 200mg - 25% ZDS

rutyna - 19mg

\*%ZDS - % zalecanego dziennego spożycia

**zalecane dzienne spożycie nie zostało ustalone**

### Działanie:

Preparat złożony o skojarzonym działaniu składników. Kwas askorbowy (witamina C) bierze udział w syntezie kolagenu, wzmacnia naczynia krwionośne oraz działa przeciwutleniająco, chroniąc organizm przed przyspieszonym starzeniem komórek i uszkodzeniem drobnych naczyń krwionośnych, będących następstwem działania wolnych rodników nadtlenkowych. Ponadto kwas askorbowy ułatwia przyswajanie żelaza i bierze udział w syntezie hemoglobiny. Rutyna dzięki wywieranemu działaniu ochronnemu na włókna kolagenu i elastyny wzmacnia ściany naczyń krwionośnych, uelastyczniając je i zwiększając ich odporność na uszkodzenie. Chroni ona także witaminę C przed utlenieniem. Wapń wpływa na budowę tkanki kostnej, skurcz mięśni (w tym serca), sekrecję hormonów i enzymów, a także na zmniejszenie wysięków naczyniowych.

### Wskazania

Wspomagająco w przeziębieniu, grypie, katarze, nadmiernej kruchości i przepuszczalności naczyń krwionośnych (żyłaki, obrzęki, krwiaki pourazowe) oraz chorobach alergicznych (katar sienny, pokrzywka, nadwrażliwość na światło).

**Przeciwwskazania**

Nadwrażliwość na składniki preparatu, hiperkalcemia (m.in. w przebiegu nadczynności przytarczyc, hiperwitaminozy D, szpiczaka mnogiego, przerzutów nowotworowych do kości), ciężka niewydolność nerek.

**Środki ostrożności**

Nie stosować w skojarzeniu z kotrimoksazolem lub antybiotykami aminoglikozydowymi. Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, sarkoidozą, kamicą nerkową oraz leczonych glikozydami naparstnicy lub epinefryną.

**Informacje dodatkowe:**

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla dzieci. Produkt niezalecany dla kobiet w ciąży.

**Sposób użycia:**

1 tabletkę powlekaną dziennie podczas posiłku lub bezpośrednio po nim.