

## Asmag B6 50 tabl.



Cena: 18,66 zł

### Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	, 02g+0, 25mg
Opakowanie	50 tabletek
Postać	tabletki
Producent	ZAKŁAD CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNY "FARMAPOL" SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek OTC
Substancja czynna	magnesii hydroaspartas, pyridoxini hydrochloridum

### Opis produktu

#### Skład Asmag B6:

Substancje czynne: magnezu wodorasparaginan czterowodny (Magnesii hydroaspartas), pirydoksyny chlorowodorek (Pyridoxini hydrochloridum). Jedna tabletki zawiera: 300mg magnezu wodorasparaginanu czterowodnego (co odpowiada 20mg jonów magnezu) i 0,25mg pirydoksyny chlorowodoru oraz substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, krzemionka koloidalna, magnezu stearynian, dekstryna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ C), metylceluloza.

#### Działanie Asmag B6:

Produkt leczniczy Asmag B6 zawiera w swoim składzie magnez oraz witaminę B6. Wskazaniem do jego stosowania są niedobory magnezu w organizmie. Zawartość witaminy B6 wpływa na zwiększenie wchłaniania magnezu, a także na zmniejszenie jego wydalania wraz z moczem. Magnez pomaga chronić mięsień sercowy, ponadto uczestniczy on w rozwoju oraz mineralizacji kości. Jest to składnik potrzebny do syntezy niektórych hormonów (m.in. insuliny). Dodatkowo pomaga zapobiegać niedotlenieniu, uczuleniom i stanom zapalnym. Przy niedoborze magnezu dochodzi do osłabienia odporności organizmu, zaburzeń układu krążenia i nerwowego, a także mięśni i tkanki kostnej. Ponadto niedobór magnezu może przyspieszać rozwój miażdżycy naczyń krwionośnych.

#### Zastosowanie:

Produkt leczniczy Asmag B6 wskazany do stosowania w leczeniu niedoborów magnezu w organizmie.

#### Informacje dodatkowe:

Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła. Możliwość zastosowania leku u kobiet, które planują dziecko, są w ciąży lub karmią piersią, należy skonsultować z lekarzem. Lek zawiera laktozę jednowodną (49,75mg w jednej tabletki) – osoby ze stwierdzoną nietolerancją niektórych cukrów powinny skonsultować z lekarzem możliwość zastosowania leku.

#### Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku. Nie stosować w przypadku hipermagnezdemii, ciężkiej niewydolności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min), biegunki, zaburzeń przewodnictwa przedsionkowo-komorowego (blok), bradykardii

(zbyt wolna praca serca), myasthenia gravis. Nie stosować w trakcie antybiotykoterapii.

**Działania niepożądane:**

Podczas stosowania leku u niektórych osób mogą wystąpić działania niepożądane. W przypadku przyjmowania większych dawek związków magnezu mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe (biegunka, nudności, wymioty).

**Dawkowanie tabletek Asmag B6:**

Stosować zgodnie z wytycznymi lekarza lub według wskazówek na ulotce. Tabletki przyjmować po posiłku, popijać wodą. Osoby dorosłe, młodzież powyżej 12. roku życia: stosować po 3 tabletki 4 razy na dobę. Dzieci: stosować po jednej tabletki 2-3 razy na dobę.