

Asmag Forte 50 tabl.



Cena: 23,37 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	034 g mg2+, 34 mg
Opakowanie	50 tabletek
Postać	tabletki
Producent	ZAKŁAD CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNY "FARMAPOL" SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek OTC
Substancja czynna	Magnezium

Opis produktu

Skład Asmag Forte:

Substancja czynna: magnezu wodorooasparaginian czterowodny. Jedna tabletkę zawiera 34mg jonów magnezu w postaci 500mg magnezu wodorooasparaginianu czterowodnego oraz substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna, krzemionka koloidalna, magnezu stearynian, dekstryna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ C), metylceluloza.

Działanie Asmag Forte:

Magnez jest jednym z ważniejszych składników budulcowych organizmu. Chroni mięsień sercowy, uczestniczy w rozwoju oraz mineralizacji kości. Ponadto jest ważny dla prawidłowego przebiegu syntezy niektórych hormonów. Pomaga przeciwdziałać stresom, uczuleniom, niedotlenieniu i stanom zapalnym. Produkt leczniczy Asmag Forte jest wskazany w celu uzupełniania niedoborów magnezu w organizmie. Ich konsekwencją może być osłabienie odporności, zaburzenia pracy układu krążenia i układu nerwowego, a także tkanki kostnej i mięśni. Ponadto niedobór może prowadzić do przyspieszenia rozwoju miażdżycy naczyń krwionośnych.

Zastosowanie:

Produkt leczniczy Asmag Forte wskazany do stosowania w leczeniu niedoborów magnezu.

Informacje dodatkowe:

Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła. Nadmierne spożycie może wywołać efekt przeczyszczający. Lek zawiera laktozę (w jednej tabletkę 20mg), co jest ważne w przypadku osób ze stwierdzoną nietolerancją niektórych cukrów. Stosowanie u kobiet w ciąży i u matek karmiących należy skonsultować z lekarzem.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku. Nie stosować poniżej 12. roku życia. Nie stosować w przypadku hipermagnezemia, ciężkiej niewydolności nerek (klirens kreatyniny <30ml/min), antybiotykoterapii, zaburzeń przewodnictwa przedsionkowo-komorowego (blok), bradykardii, myasthenia gravis, biegunki.

Działania niepożądane:

Podczas stosowania leku mogą wystąpić działania niepożądane (u niektórych osób). W przypadku przyjmowania większych dawek związków magnezu mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe (biegunka, nudności, wymioty).

Dawkowanie tabletek Asmag Forte:

Stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub według wskazówek na ulotce. Stosować doustnie, po posiłku, popijając wodą. Dorośli: przyjmować 1-2 tabletki trzy razy dziennie.