

# Aspirin Pro 0,5g 8 tabl.powl

Cena: 13,42 zł



## Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	0, 5 g
Opakowanie	8 tabl.
Postać	tabletki powlekane
Producent	BAYER SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek OTC
Substancja czynna	Acidum acetylsalicylicum

## Opis produktu

### Skład:

1 tabletki powlekane zawiera: 500 mg kwasu acetylosalicylowego. Substancje pomocnicze: krzemionka koloidalna bezwodna, sodu węglan bezwodny. Otoczka: wosk Carnauba, hypromeloza, cynku stearynian.

### Działanie:

Aspirin Pro to wyjątkowy preparat doustny. Zawiera kwas acetylosalicylowy znany przede wszystkim ze swoich właściwości przeciwagregacyjnych. Odpowiada za zmniejszenie skłonności płytek krwi do zlepiania się. W efekcie przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów oraz zatorów. Substancja czynna łagodzi ból i obniża gorączkę. Dzieje się to w wyniku zatrzymania czynności enzymu cyklooksigenazy (COX-1). Aspirin Pro ma postać tabletek przeznaczonych do stosowania doustnego.

### Przeciwwskazania:

- nadwrażliwość na substancje składowe produktu
- skaza krwotoczna
- wrzody żołądka i (bądź) dwunastnicy
- niewydolność wątroby, nerek, serca
- ataki astmy oskrzelowej spowodowane stosowaniem salicylanów bądź substancji o podobnym działaniu, przede wszystkim NLPZ,
- równoczesne stosowanie metotreksatu w dawkach 15 mg na tydzień albo większych
- trzeci trymestr ciąży
- podawanie leku dzieciom poniżej 12 lat w przebiegu infekcji pochodzenia wirusowego

### Wskazania:

Stosować u osób dorosłych i młodzieży od 12 roku życia w ramach leczenia gorączki i/albo dolegliwości bólowych o niewielkim bądź przeciętnym nasileniu (np. bólu głowy, bólów stomatologicznych, dolegliwości towarzyszących przeziębieniu i grypie).

### Dawkowanie:

Stosować doustnie. U osób dorosłych i młodzieży od 12 roku życia stosować jednorazowo 1 tabletkę. W razie potrzeby dawkę tę można zażyć ponownie po upływie przynajmniej 4h. W uzasadnionych przypadkach u osób dorosłych można stosować 2 tabl. jednorazowo. Nie stosować więcej niż 6 tabl./24h. Lek można przyjmować nie dłużej niż przez 3 dni (przy gorączce) albo 3-4 dni (przy bólu).