

AulinDol żel 0,03 g/g 100g



Cena: 42,47 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	0,03 g/g
Opakowanie	100 g (tuba)
Postać	żel
Producent	ANGELINI PHARMA POLSKA SP. Z O.O
Rejestracja	Lek OTC
Substancja czynna	Nimesulidum

Opis produktu

Składniki:

Substancja czynna: nimesulid (Nimesulidum). 1g żelu zawiera 30mg nimesulidu oraz substancje pomocnicze: glikolu dietylenowego monoetylowy eter, makrogoliglicerydów kaprylokaproniany, karbomery, disodu edetynian, metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), trietanolamina i woda oczyszczona.

Działanie:

Jako niesteroidowy lek przeciwzapalny nimesulid działa przeciwzapalnie oraz przeciwbólowo. Tę substancję czynną zawarto w produkcie leczniczym AulinDol 0,03g/g żel. Lek wskazany jest do stosowania w przypadku obrzęku i bólu, który jest związany ze skręceniami lub urazami ścięgien (tzw. ostre urazowe zapalenie ścięgien).

Zastosowanie:

Produkt leczniczy AulinDol 0,03g/g żel wskazany do objawowego leczenia bólu spowodowanego skręceniami stawów lub ostrym urazowym zapaleniem ścięgien.

Informacje dodatkowe:

Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła. Po otwarciu użyć w ciągu 14 dni. Lek zawiera metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan: mogą one powodować reakcje alergiczne (także reakcje typu późnego). Leku nie stosować na otwarte skaleczenia, rany i stany zapalne, a także w okolicach oczu i na błony śluzowe (przy kontakcie natychmiast zmyć wodą). Nie stosować doustnie – w przypadku poknięcia natychmiast zgłosić się do lekarza. Nie aplikować pod opatrunki okluzyjne. W miejscu aplikacji nie stosować żadnych maści i kremów. Stosowanie u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią: wymagana jest konsultacja z lekarzem; leku nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. Żel może brudzić skórę oraz ubrania. W przypadku miejscowego stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych może dojść do wystąpienia uczucia pieczenia, a nawet fototoksycznego zapalenia skóry (zaleca się unikać bezpośredniej ekspozycji na promienie UV w trakcie leczenia).

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku. Nie stosować w przypadku reakcji nadwrażliwości w

wywiadzie (np. zapalenie śluzówki nosa, pokrzywka lub skurcz oskrzeli) po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Nie stosować u dzieci poniżej 12. roku życia. Nie stosować jednocześnie z innymi preparatami o miejscowym działaniu. Nie stosować w przypadku zakażeń skóry.

Działania niepożądane:

U niektórych osób w trakcie leczenia mogą wystąpić działania niepożądane. Zwykle mają one łagodny charakter. Często: świąd, rumień, wysypka. W przypadku wystąpienia objawów reakcji alergicznych (np. obrzęk twarzy, ust, języka lub gardła bądź też trudności z oddychaniem), należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem. Ryzyko pojawienia się działań niepożądanych można zminimalizować, używając lek przez jak najkrótszy czas potrzebny do złagodzenia objawów.

Sposób użycia:

Lek należy stosować według zaleceń lekarza lub według wskazówek na ulotce. Ilość stosowanego żelu jest zależna od rozmiaru miejsca bolącego, zazwyczaj nakłada się cienką warstwę (3g – 6-7cm pasek żelu) w miejscu bólu i wmasowuje do całkowitego wchłonięcia. Lek aplikować 2-3 razy na dobę. Po zastosowaniu dokładnie umyć ręce. Czas leczenia: 7-15 dni. Jeśli po tygodniu objawy nie ustępują, należy skonsultować się z lekarzem.