

Bebilon® 1 Pronutra® Advance 1000 g 0 m+



Cena: 77,69 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	1-3 dni robocze
Opakowanie	1 kg
Postać	Proszek
Producent	NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O.
Zastosowanie	Karmienie dziecka

Opis produktu

Bebilon 1 z Pronutra Advance to mleko początkowe przeznaczone dla niemowląt od urodzenia, jeśli nie są one karmione piersią, do 6 miesiąca życia. Produkt jest odpowiedni jako uzupełnienie karmienia piersią, jeśli zaistnieje konieczność dokarmiania. Zaleca się stosowanie produktu wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

W przypadku zmiany formuły mleka modyfikowanego, nowy produkt należy wprowadzać stopniowo do diety niemowlęcia, uważnie obserwując jego reakcję.

Na początek można podawać dziecku porcję mleka z nową formułą tylko raz w ciągu dnia. Tak można karmić przez kolejne 2-3 dni. Jeśli dziecko zaakceptuje nową recepturę, kolejnego dnia nowym mlekiem modyfikowanym można zastąpić dwa posiłki i tak dalej. Nową formułę mleka można też wprowadzać co drugi lub trzeci dzień.

Pamiętaj, aby w czasie przechowywania i przygotowania pokarmu Bebilon z Pronutra-Advance, a także wszystkich innych preparatów dla dzieci, zawsze starannie przestrzegać instrukcji postępowania, umieszczonej na każdym opakowaniu! Niestosowanie się do tych wskazówek może stwarzać zagrożenie dla zdrowia dzieci.

Wskazania

Bebilon 1 z Pronutra Advance to mleko początkowe przeznaczone dla niemowląt od urodzenia, jeśli nie są one karmione piersią, do 6 miesiąca życia. Produkt jest odpowiedni jako uzupełnienie karmienia piersią, jeśli zaistnieje konieczność dokarmiania. Zaleca się stosowanie produktu wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

Skład

laktoza z mleka, odtłuszczone mleko w proszku, odmineralizowana serwatka w proszku z mleka, wysokooleinowy olej słonecznikowy, galaktooligosacharydy GOS z mleka (9 %), olej kokosowy, olej rzepakowy, koncentrat serwatki z mleka, olej słonecznikowy, białka mleka, fruktooligosacharydy FOS (0,6 %), olej rybi, potas, wapń, olej z Mortierella alpina, magnez, chlorek choliny, sól, witamina C, emulgator (lecytyny z soi), inozytol, L-tryptofan, żelazo, cynk, L-karnityna, przeciwutleniacz (palmitynian askorbylu), kwas pantotenowy, niacyna, miedź, witamina E, witamina A, tiamina, ryboflawina, witamina B6, jod, kwas foliowy, witamina K, selen, mangan, witamina D, biotylna, witamina B12.

Bez oleju palmowego

Informacja o alergenach.

Zawiera:

laktoza z mleka, odtłuszczone mleko w proszku, odmineralizowana serwatka w proszku z mleka, galaktooligosacharydy GOS z mleka, koncentrat serwatki z mleka, białka mleka, olej rybi, emulgator (lecycyny z soi).

Stosowanie

O ile lekarz nie zaleci inaczej:

Wartości podane w tabeli należy traktować orientacyjnie. 1 płaska miareczka to 4,6 g,

Instrukcja karmienia

Mleko powinno być przygotowane zawsze bezpośrednio przed spożyciem i wykorzystane w ciągu 2 godzin po przygotowaniu. Nigdy nie używać ponownie niewykorzystanej części mleka. Niewypitą porcję mleka wylać bezpośrednio po skończonym posiłku. Po skończonym karmieniu nie pozostawiać smoczka z resztą mleka w buzi dziecka. Nie zaleca się podgrzewania mleka w kuchenke mikrofalowej ze względu na zagrożenie oparzeniem,

Sposób przygotowania

1. Umyj ręce i wyparz naczynia potrzebne do przygotowania mleka. Wygotuj butelkę i smoczek w wodzie przez 10 minut lub użyj sterylizatora.
2. Gotuj świeżą wodę pitną przez 5 minut; pozostaw do schłodzenia (do ok. 40°C). Sprawdź tabelę żywienia na opakowaniu.
3. Wlej dokładną ilość uprzednio przegotowanej ciepłej wody do wygotowanej butelki.
4. Używaj wyłącznie załączonej miareczki.
5. Odmierz dokładną ilość płaskich, nieubitych miareczek mleka .
6. Dodaj odmierzoną ilość proszku do butelki.
7. Zamknij butelkę i potrząśnij do całkowitego rozpuszczenia proszku. Załóż na butelkę wygotowany smoczek.
8. Sprawdź temperaturę mleka wewnętrzną stroną przegubu dłoni.
9. Umyj butelkę i smoczek zaraz po użyciu.

Ważne informacje

- Karmienie piersią jest najwłaściwszym sposobem żywienia niemowląt. Częściowe lub całkowite zastąpienie mleka matki mlekiem modyfikowanym powinno być uzgodnione z lekarzem pediatrą.
- Zaleca się, aby przejście z karmienia mlekiem Bebilon 1 na Bebilon 2 przeprowadzać stopniowo, zmniejszając ilość proszku Bebilon 1 i zwiększając ilość proszku Bebilon 2.
- Niewłaściwe przygotowanie i przechowywanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.

Przechowywanie.

- Opakowanie zewnętrzne powinno być wyrzucone dopiero po całkowitym wykorzystaniu zawartości, ze względu na umieszczone na nim ważne informacje.
- Nie zaleca się przesypywania mleka do innych pojemników.
- Produkt, przed użyciem i po otwarciu, powinien być przechowywany w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze od 10°C do 25°C.
- Nie należy przechowywać w lodówce.
- Zawartość opakowania powinna być zużyta w ciągu 4 tygodni po otwarciu.
- Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.

NUTRICIA Polska Sp. z o.o.,

ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Warszawa