

Bepanthen Plus krem 30g



Cena: 40,07 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	(5mg+0,05g)/g
Opakowanie	30 g
Postać	krem
Producent	BAYER SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek OTC
Substancja czynna	Chlorhexidinum, dexpanthenolum

Opis produktu

Składniki:

1 g kremu zawiera 50 mg dekspantenolu i 5 mg chlorowodoru chlorheksydyny.

Działanie:

Wchłonięty przez skórę dekspantenol jest przekształcany w kwas pantotenowy, który odgrywa ważną rolę w metabolizmie komórkowym jako składnik CoA. Bierze także udział w budowie skóry i błon śluzowych oraz przyspiesza proces gojenia ran w wyniku pobudzenia mitozy i wpływu na włókna kolagenowe. Chlorheksydyna działa bakteriobójczo, zwłaszcza wobec bakterii Gram-dodatnich (w tym *Staphylococcus aureus*), ponadto wykazuje mniejszą aktywność przeciw bakteriom Gram-ujemnym. Nie wykazuje działania przeciwwirusowego i przeciwgrzybiczego.

Wskazania:

Zapobieganie zakażeniom ran (otarcia, skaleczenia, pęknięcia, oparzenia i podrażnienia skóry). Uszkodzenia i rany skóry po niewielkich zabiegach chirurgicznych.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na składniki preparatu, oparzenia słoneczne. Nie stosować do oczu oraz na błony śluzowe.

Działanie niepożądane:

Rzadkie reakcje nadwrażliwości.

Interakcje:

Chlorheksydyna wykazuje niezgodność chemiczną z mydłem i innymi anionowymi środkami powierzchniowo czynnymi - preparatu nie należy stosować w połączeniu z innymi środkami antyseptycznymi.

Sposób użycia:

Raz lub kilka razy dziennie nanosi się warstwę kremu na skórę chorobowo zmienioną.