

Bioaron C syrop 200ml



Cena: 30,44 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	(1,051g)/5ml, 17g+0,92g+1
Opakowanie	200 ml
Postać	syrop
Producent	PHYTOPHARM KLĘKA S.A.
Rejestracja	Lek ziołowy
Substancja czynna	Acidum ascorbicum, aloe extractum fluidum, aroniae succus

Opis produktu

Składniki:

Substancja czynna: Bioaron System (Extractum Aloes arborescentis recens fluidum + Vitaminum C), w 100ml – 38,4g wyciągu płynnego ze świeżych liści aloesu drzewiastego (DER 1:4, ekstrahent: woda) + 1,02g witaminy C. 5ml syropu zawiera 1920mg wyciągu z aloesu i 51 mg witaminy C oraz substancje pomocnicze: sacharoza, sok z aronii zagęszczony, benzoesan sodu, woda oczyszczona.

Działanie:

Unikalne składniki produktu leczniczego Bioaron System stymulują poszczególne składowe układu immunologicznego, przez co sprawiają, że infekcja przebiega łagodniej, ponadto pomagają budować odporność, co zmniejsza częstotliwość występowania infekcji. Lek oddziałuje na odpowiedź humoralną oraz komórkową, dzięki czemu wzrasta liczba limfocytów B i T, a także liczba przeciwciał krążących we krwi. Tym sposobem preparat przywraca prawidłową odpowiedź układu immunologicznego. Organizm lepiej radzi sobie wówczas z infekcjami wirusowymi i bakteryjnymi. Lek jest skuteczny również w przypadku braku apetytu u dzieci. Oprócz wyciągu z aloesu drzewiastego syrop zawiera także witaminę C i sok z aronii.

Produkt leczniczy Bioaron System syrop wskazany do stosowania pomocniczo przy infekcjach górnych dróg oddechowych np. chorób z przebiegiem, a także przy braku apetytu. Działanie leku opiera się na długim okresie stosowania oraz doświadczeniu.

Informacje dodatkowe:

Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła. Lek zawiera sacharozę – w 5ml około 3,93g sacharozy. Nie zaleca się stosować w przypadku nietolerancji fruktozy, zespołu złego wchłaniania glukozy-galaktozy, niedoboru sacharozy-izomaltazy. Dotychczas nie stwierdzono występowania działań niepożądanych podczas stosowania leku, w przypadku pojawienia się jakichkolwiek skutków ubocznych zaleca się przerwać przyjmowanie syropu.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku. Nie stosować u dzieci poniżej 3. roku życia.

Sposób użycia:

Stosować według zaleceń lekarza lub zaleceń na ulotce. Stosować doustnie. Infekcje górnych dróg oddechowych – dzieci od 3. do 6.

roku życia: dwa razy dziennie po 5ml; dzieci powyżej 6. roku życia, młodzież, dorośli: trzy razy dziennie po 5ml. Zaleca się stosować przez 14 dni (jeśli po 7 dniach nie nastąpi żadna poprawa zaleca się skonsultować z lekarzem), przyjmować przed jedzeniem. Przy braku apetytu zaleca się stosować 5ml leku jednorazowo 15 minut przed posiłkiem. Zaleca się skonsultować z lekarzem w przypadku wrażenia, że działanie preparatu jest zbyt słabe lub zbyt mocne.