


# Bisacodyl VP 5mg 30 tabl.



Cena: 20,71 zł

## Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	5 mg
Opakowanie	30 tabletek
Postać	tabletki dojelitowe
Producent	ICN POLFA RZESZÓW S.A.
Rejestracja	Lek OTC
Substancja czynna	Bisacodylum

## Opis produktu

### Bisacodyl skład:

Bisacodyl, skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna, talk, stearynian magnezu, żelatyna, kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu etylu, wodorotlenek sodu, cytrynian trietylu, polisorbat 20, talk, dwutlenek tytanu, czerwień koszenilowa, lak, symetykon.

### Działanie tabletek Bisacodyl:

Substancja aktywna preparatu bisacodyl działa bezpośrednio na jelito grube, gdzie wpływa na sploty nerwowe błony śluzowej. Stymuluje perystaltykę jelit poprzez zmniejszanie wchłaniania wody i elektrolitów, dzięki czemu rozluźnia masy kałowe i ułatwia wypróżnianie. Preparat ma również działanie wiatropędne. Preparat działa po około 6-12 godzinach od zażycia.

### Zastosowanie:

Stosować w przypadku zaparc – nawykowych i przewlekłych zaparciach u poważnie chorych, nawykowych zaparciach u osób w podeszłym wieku, zaparciach spowodowanych zmianą diety oraz zaparciach w okresie pooperacyjnym. Wskazany do stosowania przed badaniami diagnostycznymi i zabiegami chirurgicznymi w celu opróżnienia jelit.

### Przeciwwskazania:

Nie stosować u dzieci poniżej 4. roku życia, w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu. Nie stosować w zespole ostrego brzucha, bólu brzucha o nieznanej etiologii i towarzyszącym mu nudnościami i wymiotami, w przypadku choroby Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i krwawienia przewodu pokarmowego oraz ciężkiego odwodnienia.

### Działanie niepożądane:

Bardzo rzadko występujące reakcje alergiczne i anafilaktoidalne.

### Sposób użycia:

Tabletki zawsze popijać dużą ilością wody, połykać w całości, nie rozkruszać ani nie rozgryzać. Dzieci od 4. do 10. roku życia: 1 tabletkę zażywać na noc. Dorośli oraz dzieci powyżej 10. roku życia: 1-2 tabletki zażywać na noc. W przypadku osób starszych, pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i nerek nie trzeba zmieniać dawek.