

Bronchipret TE syrop 100ml



Cena: 35,21 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	15g+1, 5g
Opakowanie	1 but. po 100 ml
Postać	syrop
Producent	BIONORICA SE
Rejestracja	Lek OTC
Substancja czynna	hederae helicis extractum fluidum, thymi herbae extractum fluidum

Opis produktu

Składniki:

Substancje czynne leku: płynny ekstrakt z ziela tymianku (Thymi herbae extractum fluidum, DER: 1:2-2:5; rozpuszczalnik ekstrakcyjny: roztwór amoniaku 10%: glicerol 85%: etanol 90% : woda oczyszczona (1:20:70:109)), płynny ekstrakt z liści bluszczu pospolitego (Hederae helicis folii extractum fluidum; DER: 1:1; rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70%). 100g syropu zawiera: płynny ekstrakt z ziela tymianku – 15g, płynny ekstrakt z liści bluszczu pospolitego – 1,5g. Pozostałe składniki: kwas cytrynowy jednowodny, woda oczyszczona, sorbinian potasu, maltitol ciekły (16,5mg maltitolu/100g Bronchipret TE).

Działanie:

Lek w postaci syropu Bronchipret TE to sposób na oczyszczenie dróg oddechowych z zalegającej tam wydzieliny. W skład preparatu wchodzi dwie substancje czynne: ekstrakt z ziela tymianku oraz ekstrakt z liści bluszczu pospolitego. Ziele tymianku działa stymulująco na mechanizmy samooczyszczania dróg oddechowych, umożliwia szybsze i łatwiejsze odkrztuszanie wydzieliny. Liście bluszczu pospolitego wykazują działanie sekretolityczne.

Produkt leczniczy Bronchipret TE wskazany do stosowania przy objawach kaszlu z towarzyszącą im zalegającą wydzieliną, a także w infekcjach i stanach zapalnych dróg oddechowych o łagodnym lub umiarkowanym stopniu (np. ostre zapalenie oskrzeli).

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku: substancje czynne lub pomocnicze, a także w przypadku nadwrażliwości na inne rośliny z rodziny jasnotowatych oraz araliowatych, bylicę pospolitą, brzozę lub seler. Nie stosować u dzieci poniżej 2. roku życia, u kobiet w ciąży oraz u kobiet karmiących piersią.

Działania niepożądane:

W trakcie przyjmowania leku mogą pojawić się działania niepożądane. Możliwe objawy niepożądane to: zaburzenia żołądka i jelit: zaburzenia żołądkowo-jelitowe (np. wymioty, nudności, biegunka – niezbyt często); zaburzenia układu immunologicznego: reakcje nadwrażliwości skóry z wysypką – rzadko. Działania niepożądane – częstość nieznana: reakcje nadwrażliwości: pokrzywka, obrzęk twarzy, ust i/lub okolicy gardła, duszność wysiłkowa. Jeśli wystąpią reakcje nadwrażliwości konieczne jest natychmiastowe przerwanie przyjmowania leku.

Sposób użycia:

Lek należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub wskazówkami umieszczonymi na ulotce. Odmierzoną dawkę należy podawać doustnie, bez rozcieńczania, ewentualnie można popić niewielką ilością wody. Przed użyciem wstrząsnąć. Lek należy przyjmować trzy razy dziennie. Dzieci od 2. do 5. roku życia: 3,2ml trzy razy dziennie (dawka dobową całkowitą: 9,6ml). Dzieci od 6. do 11. roku życia: 4,3ml trzy razy dziennie (dawka dobową całkowitą: 12,9ml). Dorośli, młodzież powyżej 12. roku życia: 5,4ml trzy razy na dobę (dawka dobową całkowitą: 16,2ml). Po 10 dniach stosowania leku bez uzyskania jakiegokolwiek poprawy lub przy występowaniu trudności w oddychaniu, krwistej lub ropnej wydzieliny, gorączki należy skontaktować się z lekarzem.