

Buscopan Forte 0,02 g 10 tabl.powl

Cena: 23,50 zł



Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	20mg
Opakowanie	10 tabl.
Postać	tabletki powlekane
Producent	IPSEN PHARMA
Rejestracja	
Substancja czynna	Hyoscine

Opis produktu

Skład:

1 tabletkę zawiera substancję czynną - butylobromek hioscyny 20 mg i substancje pomocnicze - fosforan wapnia, skrobia kukurydziana, skrobia rozpuszczalna, kwas krzemowy koloidalny (Aerosil), kwas winowy, kwas stearynowy, poliwinylpirolidon, sacharoza, talk, guma arabska, dwutlenek tytanu, polietylenoglikol 6000, wosk Karnauba, wosk biały.

Działanie:

Buscopan Forte to preparat, który zawiera butylobromek hioscyny, będący czwartorzędową pochodną amonową. Wykazuje właściwości rozkurczowe (spazmolityczne) wobec mięśni gładkich przewodu pokarmowego, dróg żółciowych i układu moczowego. Zatrzymuje zakończenia neuronów cholinergicznyc. Blokuje ruchy perystaltyczne jelit. Substancja czynna słabo przenika z przewodu pokarmowego. Buscopan Forte ma postać tabletek przeznaczonych do stosowania doustnego.

Przeciwwskazania:

- nadwrażliwość na substancje składowe preparatu
- nużliwość mięśni
- patologiczne poszerzenie jelita grubego
- rzadkie choroby dziedziczne, które mogą być wywoływać niezgodność ze składnikami pomocniczymi preparatu
- stosowanie u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Wskazania:

Zaleca się stosowanie preparatu u osób dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 6 roku życia w przypadku kolki jelitowej, kolki wątrobowej, kolki nerkowej, bolesnych menstruacji.

Dawkowanie:

Stosować doustnie. W przypadku osób dorosłych i młodzieży powyżej 12 r.ż. zaleca się stosowanie 10-20 mg (1-2 tabl.) x 3-4/24h. Dzieciom w wieku 6-12 lat podawać 10 mg (1 tabl.) x 3/24h.