

Calominal 60 tabl.



Cena: 59,74 zł

Opis słownikowy

| | |
|--------------|-------------------------------------|
| Czas dostawy | 2-5 dni |
| Opakowanie | 60 tabletek |
| Postać | tabletki |
| Producent | AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O. |
| Rejestracja | Wyrób medyczny leczniczy |

Opis produktu

Skład Calominal:

Celuloza, chitozan, poliwinylpirolidon, sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu.

Działanie Calominal:

Produkt do stosowania wspomagająco w leczeniu nadwagi, w procesie kontrolowania wagi ciała oraz w celu zmniejszenia przyswajania cholesterolu. Wyrób medyczny Calominal zawiera chitozan, który wiąże duże ilości lipidów, a dzięki temu, że nie jest trawiony w organizmie, jest wydalany wraz ze związanymi tłuszczami. Innymi słowy chitozan ogranicza ilość tłuszczów wchłanianych z pożywienia, czyli zmniejsza ilość dostarczanych kalorii. Preparat pomaga ograniczać ilość przyswajanego z diety cholesterolu, wspiera redukcję oraz kontrolę wagi ciała. Stosowanie wyrobu medycznego Calominal powinno być połączone z aktywnością fizyczną i zdrowym odżywianiem, pozwoli to osiągnąć optymalne efekty.

Zastosowanie:

Wyrób medyczny Calominal przeznaczony do stosowania wspomagającego w leczeniu nadwagi oraz w kontrolowaniu wagi ciała oraz w zmniejszaniu przyswajania cholesterolu.

Informacje dodatkowe Calominal:

Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła. Możliwość stosowania u dzieci powyżej 3. roku życia i u młodzieży należy skonsultować z lekarzem. Produkt nie ma zdolności wiązania innych składników pożywienia niż tłuszcze, czyli cukrów, węglowodanów, białka i alkoholu.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu. Nie stosować w przypadku uczulenia na produkty pochodzące z ryb, mięczaków i skorupiaków. Nie stosować u dzieci poniżej 3. roku życia. Nie jest zalecane stosowanie u kobiet w okresie ciąży i laktacji.

Działania niepożądane Calominal:

U niektórych osób mogą wystąpić działania niepożądane podczas stosowania preparatu. Rzadko: może dochodzić do zaburzeń trawienia (uczucie pełności, wzdęcia, zaparcia), zwykle jest to spowodowane przyjmowaniem niedostatecznej ilości płynów. W przypadku uporczywych zaparć zaleca się zaprzestać stosowania preparatu i skonsultowanie z lekarzem. Bardzo rzadko: może wystąpić reakcja alergiczna (m.in. biegunka, nudności i wymioty, wysypka skórna, świąd, mrowienie, zawroty i bóle głowy), wówczas należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem.

Sposób użycia tabletek Calominal:

Zaleca się stosować podczas głównych posiłków, popijać wodą (przynajmniej 250ml). Podczas stosowania preparatu należy wypijać przynajmniej 2-3 litry płynów dziennie. Redukcja wagi ciała: stosować dwie tabletki dwa razy dziennie. Kontrola wagi ciała: stosować jedną tabletkę dwa razy dziennie. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.