

Clotrimazolum GSK krem 0,01 g/g 20g



Cena: 8,75 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	0,01 g/g
Opakowanie	20 g
Postać	krem
Producent	GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S.A.
Rejestracja	Lek OTC
Substancja czynna	Clotrimazolum
Zastosowanie	Grzybica

Opis produktu

Składniki:

Substancja czynna: klotrymazol (Clotrimazolum). 1g kremu zawiera 10mg klotrymazolu oraz substancje pomocnicze: alkohol cetostearylowy, oktylododekanol, polisorbat 60, sorbitanu stearynian, olbrot syntetyczny, alkohol benzylowy, woda oczyszczona.

Działanie:

Klotrymazol zabija znaczną część grzybów, które najczęściej wywołują zakażenia u ludzi. Co ważne, jest bardzo skuteczny w likwidowaniu drożdżaków oraz dermatofitów. Produkt leczniczy Clotrimazolum GKS 1% krem stosuje się w grzybiczych zakażeniach skóry np. w przypadku grzybicy stóp lub kandydozy błony śluzowej zewnętrznych narządów płciowych.

Zastosowanie:

Produkt leczniczy Clotrimazolum GKS 1% krem wskazany do stosowania w leczeniu miejscowym grzybicy skóry stóp i rąk, podudzi, nóg i tułowia, które wywołane są przez dermatofity; łupieżu pstrego; zakażeń skóry i błon śluzowych zewnętrznych narządów płciowych (np. napletka, warg sromowych), które wywołane są przez drożdżaki (kandydozy).

Informacje dodatkowe:

Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła. Nie zamrażać. Produkt może uszkadzać lub osłabiać skuteczność lateksowych prezerwatyw oraz krążków domacicznych (w okresie leczenia oraz 5 dni po jego zakończeniu zaleca się stosować inne metody antykoncepcji). Zawarty w kremie alkohol cetostearylowy może spowodować miejscową reakcję skórą (np. kontaktowe zapalenie skóry z obrzękiem, wypryskiem lub pęcherzykami).

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik kremu. Nie stosować w pierwszym trymestrze ciąży. Przed rozpoczęciem stosowania leku należy przerwać karmienie piersią.

Działania niepożądane:

Podczas stosowania leku u niektórych osób mogą wystąpić skutki uboczne. Częstość nieznana: reakcje uczuleniowe – pokrzywka, duszności, zbyt niskie ciśnienie krwi, omdlenie: świąd, wysypka, pęcherze, złuszczenie się naskórka, uczucie bólu lub dyskomfortu, pieczenie, kłucie, obrzęk, podrażnienie, rumień.

Sposób użycia:

Do stosowania miejscowego. Stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub według wskazówek na ulotce. Aplikować 2-3 razy na dobę. Rozprowadzić ciekłą warstwę kremu na skórę w miejscu zmienionym chorobowo. Stosować jednocześnie na wszystkie miejsca zakażone. Stosować przez 2-4 tygodnie, nie należy przerywać stosowania kremu od razu po ustąpieniu objawów, gdyż mogą one nawrócić. W przypadku, gdy po 7 dniach aplikacji leku objawy nie zaczną ustępować lub się nasilią należy skonsultować się z lekarzem. Unikać kontaktu z okolicami oczu. Nie połykać.

Clotrimazolum w ciąży:

Nie zaleca się stosowania Clotrimazolum GSK w okresie ciąży, a szczególnie w I trymestrze. Jednak lekarz prowadzący, oceniając korzyści nad ryzyko kuracji, może dopuścić jego włączenie na późniejszym etapie ciąży.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa należy stosować go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.