

Clotrimazolum płyn na skórę 0,01g 15ml

**Cena: 10,13 zł**

Opis słownikowy

Czas dostawy	1-3 dni robocze
Dawka	01 g/ml, 10 mg
Opakowanie	15 ml (but.)
Postać	płyn do stosowania na skórze
Producent	Polpharma
Rejestracja	
Substancja czynna	Clotrimazolum

Opis produktu

Skład:

1ml płynu na skórę zawiera: substancję czynną: klotrymazol – 10mg, substancje pomocnicze: izopropylu mirystynian, etanol bezwodny.

Działanie:

Klotrymazol zaliczany jest do leków z grupy imidazolu, wykazuje on szeroki zakres działania przeciwgrzybiczego. Stosowany w małych stężeniach przyczynia się do zahamowania wzrostu grzybów (działanie grzybobójcze) – dermatofitów (bakterie z rodzaju Epidermophyton, Trichophyton, Microsporum spp), drożdżaków (Candida albicans oraz inne gatunki z rodzaju Candida, Cryptococcus neoformans, Malassezia furfur), Aspergillus spp., pleśni i grzybów dimorficznych (Blastomyces dermatidis, Coccidioides immitis, Sporotrichum scheneckii). Natomiast stosowany w dużych stężeniach wykazuje działanie grzybobójcze.

Zastosowanie:

Produkt leczniczy Clotrimazolum 1% płyn na skórę wskazany do stosowania w grzybiczych zakażeniach skóry (dermatofity, drożdżaki), a także przy łupieżu pstym oraz grzybicach wałów paznokciowych.

Informacje dodatkowe:

Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zastosowanie u kobiet w ciąży i karmiących piersią, a także u dzieci poniżej 11. roku życia należy skonsultować z lekarzem.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku. Nie stosować doustnie ani w okolicy oczu. Nie aplikować pod opatrunkiem okluzyjnym.

Działania niepożądane:

Podczas stosowania leku mogą pojawić się objawy niepożądane, w rzadkich przypadkach mogą pojawić się reakcje uczuleniowe m.in. odczyn uczuleniowy, świąd, kłucie, pieczenie, a także podrażnienie o charakterze przemijającym w miejscu aplikacji leku. Bardzo rzadko: rumień uogólniony, obrzęk, wysypka, pokrzywka, złuszczenie naskórka, pęknięcie naskórka.

Dawkowanie:

Do stosowania miejscowego na skórę. W przypadku, gdy lekarz nie zaleci specjalnego dawkowania, zaleca się wcierać kilka kropli płynu w skórę, aplikację należy powtarzać 2-3 razy dziennie. Czas leczenia – aż do całkowitego ustąpienia objawów. Po złagodzeniu ostrych objawów choroby leczenie powinno być prowadzone przez kolejne 4 tygodnie (minimum). Przy grzybicy stóp leczenie należy przedłużyć o kolejne dwa tygodnie po ustąpieniu wszystkich objawów, aby zmniejszyć ryzyko nawrotu.