

Contrahist Allergy 5mg 10 tabl. powl.

Cena: 13,33 zł



Opis słownikowy

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Czas dostawy | 2-5 dni |
| Dawka | 5 mg |
| Opakowanie | 10 tabletek |
| Postać | tabletki powlekane |
| Producent | ADAMED CONSUMER HEALTHCARE S.A. |
| Rejestracja | Lek OTC |
| Substancja czynna | Levocetirizine |

Opis produktu

Skład

Substancją czynną jest: lewocetyryzyny dichlorowodorek.

1 tabletkę zawiera 5 mg lewocetyryzyny dichlorowodoru (4,2 mg lewocetyryzyny).

Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna (typ 102), laktoza jednowodna, magnezu stearynian, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania doustnego.

Nie stosować leku dłużej niż 10 dni bez konsultacji z lekarzem.

Jeśli po 3 dniach stosowania leku, nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej - należy skonsultować się z lekarzem.

Tabletkę należy przyjmować w całości, z posiłkiem lub niezależnie od posiłku.

Dorośli i dzieci w wieku 6 lat i powyżej: 1 tabletkę (5 mg) na dobę.

Działanie

Contrahist Allergy wykazuje działanie przeciwalergiczne. Lewocetyryzyna jest blokerem receptorów H1 dla histminy.

Wskazania

Leczenie objawowe alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (w tym przewlekłego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa), przewlekłej pokrzywki idiopatycznej.

Przeciwwskazania

w przypadku nadwrażliwości (uczulenia) na lewocetyryzyny dichlorowodorek, lek przeciwalergiczny lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku,

jeśli u pacjenta występuje ciężkie zaburzenie czynności nerek (ciężka niewydolność nerek z klirensiem kreatyniny mniejszym niż

10ml/min),
jeśli u pacjenta występuje dziedziczna nietolerancja galaktozy, niedobór laktazy (typu Lapp) lub zespół złego wchłaniania glukozy-
galaktozy.