

Daktarin krem 0,02g 15 g



Cena: 38,16 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	02 g/g, 20mg
Opakowanie	15 g
Postać	krem
Producent	MCNEIL PRODUCTS LIMITED C/O JOHNSON & JOHNSON LTD
Rejestracja	
Substancja czynna	Miconazolum

Opis produktu

Skład

1 g kremu, pudru lub pudru w aerozolu zawiera 20 mg azotanu mikonazolu.

Działanie

Pochodna imidazolu o szerokim zakresie działania przeciwgrzybiczego. Hamuje biosyntezę ergosterolu niezbędnego do budowy błony komórkowej grzyba, co prowadzi do jej uszkodzenia i obumarcia komórki grzyba. Działa na dermatofity (rodzaje Trichophyton, Epidermophyton, Microsporum) i drożdżaki (rodzaje Candida, Cryptococcus). Działa również przeciwbakteryjnie na ziarniaki Gram-dodatnie (paciorkowce, gronkowce). Wywiera szybkie działanie przeciwświądowe. Wchłania się w bardzo małym stopniu po zastosowaniu na skórę.

Wskazania*

Grzybice skóry wywołane przez dermatofity i drożdżaki (m.in. grzybica głowy, ciała, także stóp i paznokci, łupież pstry, figówka obrębna pachwin) oraz grzybicze zakażenia skóry z nadkażeniem bakteryjnym.

Dawkowanie

Na chorobowo zmienioną skórę nanosi się 2 razy dziennie puder lub krem (krem należy wcierać aż do całkowitego wchłonięcia). W przypadku skojarzonego stosowania pudru i kremu, należy raz dziennie nakładać puder i raz dziennie krem. Czas trwania leczenia wynosi 2-6 tyg.; leczenie należy kontynuować przez 7 dni po ustąpieniu zmian. W kandydozie skóry, grzybicy ciała, paznokci i łupieżu pstym leczenie trwa zazwyczaj 2 tygodnie; w grzybicy stóp - 4-6 tygodni. W grzybicy paznokci krem należy stosować pod opatrunki zamknięte. W zapobieganiu grzybicy stóp stosuje się puder raz dziennie do środka butów i skarpetek.