

Dexak 0,025 g 10 tabl.powl.



Cena: 15,14 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	25mg
Opakowanie	10 tabl.
Postać	tabletki powlekane
Producent	BERLIN CHEMIE AG
Rejestracja	
Substancja czynna	Dexketoprofenum

Opis produktu

Skład:

1 tabletkę powlekaną zawiera 36,90 mg trometamolu deksketoprofenu, co odpowiada 25 mg deksketoprofenu. Inne składniki to: skrobia kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa, glicerolu distearynian, hypromeloza, tytanu dwutlenek, glikol propylenowy, makrogol 6000.

Działanie:

Dexak to doustny preparat wchodzący w skład grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Zawiera substancję czynną o nazwie trometamolu deksketoprofen. Działa przeciwbólowo i efektywnie redukuje dolegliwości bólowe o nasileniu małym i przeciętnym. Wykazuje właściwości przeciwzapalne i przeciwgorączkowe. Jest to skutkiem blokowania aktywności cyklooksygenazy. DEXAK łagodzi ból już po 0,5h od momentu zastosowania. Jego działanie utrzymuje się przez 4-6h.

Przeciwwskazania:

- uczulenie na składniki leku
- wrzody żołądka i (bądź) dwunastnicy, krwawienie z żołądka albo jelit albo długotrwałe zaburzenia trawienne w postaci niestrawności, zgagi
- nadwrażliwość na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ);
- napady astmy, ostry alergiczny katar, polipy nosa, pokrzywka (wysypka pęcherzykowa), obrzęk naczynioruchowy bądź świszczący oddech po zastosowaniu preparatu z grupy NLPZ;
- krwawienie z żołądka albo jelit bądź perforacje mające związek z przyjmowaniem leków z grupy NLPZ zażywanych w ramach leczenia bólu
- choroby jelit, którym towarzyszy przewlekły stan zapalny (wrzodziejące zapalenie jelita grubego bądź choroba Leśniowskiego-Crohna);
- poważne zaburzenia wydolności serca, przeciętna bądź ciężka niewydolność nerek lub ciężka niewydolność wątroby;
- zbyt duża tendencja do powstawania krwawień lub zaburzenia krzepnięcia;
- ciąża i okres karmienia piersią
- stosowanie u osób poniżej 18 roku życia

Wskazania:

Lek podawać osobom dorosłym powyżej 18 roku życia w celu zredukowania dolegliwości bólowych o natężeniu małym lub umiarkowanym. Wskazany przy bólu o charakterze mięśniowo-kostnym, bólach towarzyszących menstruacji i bólach stomatologicznych.

Dawkowanie:

Stosować doustnie. Stosować w dawce wynoszącej 12,5 mg co 4-6 h albo 25 mg co 8 h. Nie przyjmować więcej niż 75 mg/24h.