

Dicopeg 14 saszetek x 10g



Cena: 53,74 zł

Opis słownikowy

| | |
|--------------|--|
| Czas dostawy | 2-5 dni |
| Opakowanie | 14 saszetek po 10 g |
| Postać | proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej |
| Producent | VITIS PHARMA |
| Rejestracja | Wyrób medyczny inny |

Opis produktu

Skład:

Makrogol 3350. Substancje pomocnicze: dwutlenek krzemu, aromat, sól sodowa sacharyny.

Działanie:

Środek przeczyszczający o działaniu osmotycznym naturalnie reguluje funkcjonowanie jelit. Makrogol zawarty w wyrobie medycznym Dicopeg nie fermentuje w jelitach, nie działa podrażniająco na błony śluzowe, a także nie jest wchłaniany. W niezmięnionej formie zostaje wydalony z kałem. Preparat będzie skuteczny zarówno przy sporadycznych zaburzeniach pracy jelit, jak również w przypadku przewlekłych zaparć. Hydrofilowe właściwości wpływają na zmiękczenie stolca, co ułatwia i przyspiesza wypróżnianie. Produkt nie działa w sposób nagły – nie powoduje skurczów, bólów brzucha i silnego parcia. Nawet przy dłuższym stosowaniu skuteczność preparatu nie obniża się.

Zastosowanie:

Wyrób medyczny Dicopeg przeznaczony do stosowania przy przewlekłych zaparciach, a także przy sporadycznych zaburzeniach pracy jelit.

Informacje dodatkowe:

Preparat nie zawiera glutenu. Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Stosowanie preparatu u dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią powinno zostać skonsultowane z lekarzem. Zaleca się stosować dwugodzinne przerwy między przyjmowaniem Dicopegu a innych leków.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu. Nie stosować u dzieci poniżej 6. miesiąca życia. Nie stosować w przypadku perforacji i/lub niedrożności układu pokarmowego, a także zmian chorobowych układu pokarmowego lub wydalinowego, choroby Leśniowskiego-Crohna oraz innych chorób zapalnych jelit, wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, ostrego rozdęcia okrężnicy.

Sposób użycia:

Dzieci od 6. miesiąca życia do 2. roku życia (do 12kg): zaleca się podawać 1 saszetkę dziennie. Dzieci od 2. do 11. roku życia (12-20kg): zaleca się podawać 1-2 saszetki dziennie. Dzieci powyżej 11. roku życia (>20kg), dorośli: zaleca się przyjmować 1-3 saszetki dziennie. Dzienna dawka może być przyjmowana w kilku porcjach. Zależnie od indywidualnych reakcji pacjenta dawka może być zmniejszona lub zwiększona, jednak decyzję powinien podjąć lekarz. Maksymalna dzienna dawka to 6 saszetek. Zawartość saszetki należy rozpuścić w 125ml wody (około pół szklanki) i wypić. Można także jednorazowo rozpuścić całą dzienną dawkę (np. 3 saszetki w 375ml wody) i przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku w lodówce, jednak nie dłużej niż 24 godziny. Dicopeg należy spożywać w dużych odstępach czasowych od zjedzonych posiłków.