

Dicopeg Junior Free 14 saszetek



Cena: 47,81 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Opakowanie	14 saszetek po 5 g
Postać	proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej
Producent	VITIS PHARMA
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Składniki Dicopeg Junior Free:

Makrogol 3350 5g.

Działanie Dicopeg Junior Free:

Dicopeg Junior Free z makroglem 3350 wykazuje działanie przeczyszczające przy przewlekłych zaparciach. Preparat pomaga przy nieregularnej pracy jelit. Właściwości hydrofilowe makrogolu przyczyniają się do zmiękczenia stolca, co ułatwia wypróżnienie (bez bólów, skurczów i nagłego parcia). Substancja czynna nie wchłania się i nie fermentuje w jelitach, nie powoduje również podrażnienia śluzówki, jest wydalana z kałem w niezmienionej formie. Skuteczność preparatu nie zmniejsza się wraz z upływem czasu.

Zastosowanie:

Wyrób medyczny Dicopeg Junior Free przeznaczony do stosowania jako środek o osmotycznym działaniu przeczyszczającym w celu regulacji pracy jelit w przypadku przewlekłego zaparcia bądź sporadycznych przypadków nieregularnej pracy jelit.

Informacje dodatkowe:

Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Należy chronić przed działaniem światła, ciepła, temperatury powyżej 25st. C. W przypadku przedawkowania preparatu mogą wystąpić wzdęcia i silne bóle, a także biegunka, która może przyczynić się do wystąpienia zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej. Podejrzanie przedawkowania należy natychmiast skonsultować z lekarzem. Saszетка jednorazowego użytku.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu. Nie stosować w przypadku uszkodzenia żołądka lub jelit. Nie zaleca się stosować w przypadku perforacji lub niedrożności jelit, które wynikają z zaburzeń budowy lub działania ścian jelit, jelita krętego bądź w przypadku schorzeń jelit o charakterze zapalnym (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna, ostre rozdęcie okrężnicy). Nie stosować poniżej 6. miesiąca życia.

Sposób użycia saszetek Dicopeg Junior Free:

O ile lekarz nie zaleci inaczej, zaleca się stosować według schematu: dzieci od 6. miesiąca do 2. roku życia (do 12kg): 1-2 saszetki dziennie; dzieci od 2. do 11. roku życia (12-20kg): 2-4 saszetki dziennie; dzieci powyżej 11. roku życia (powyżej 20kg): 2-6 saszetki dziennie. Maksymalna dzienna dawka to 6 saszetek (30g). W zależności od indywidualnej reakcji można zmniejszyć lub zwiększyć dawkę, przy czym należy to konsultować z lekarzem. Zawartość jednej saszetki należy rozpuścić w 62,5ml wody (herbaty, naparu

ziołowego, rosółu, mleka lub soku owocowego). Dzienną dawkę można przyjmować w kilku porcjach (zawartość saszetek rozpuścić w odpowiedniej ilości płynu i przechowywać w zamkniętym pojemniku w lodówce maksymalnie przez 24 godziny). Przyjmować w długich odstępach od posiłków. Podczas kuracji preparatem zaleca się stosować odpowiednią dietę, a także przyjmować doustne płyny nawadniające. Nie należy przyjmować dłużej niż przez okres 30 dni, jeśli w tym czasie objawy nie ustąpiły, należy skonsultować się z lekarzem. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.