


Diosminex 500mg 60 tabl.



Cena: 65,40 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	0,5 g
Opakowanie	60 tabl.
Postać	tabletki powlekane
Producent	PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.
Rejestracja	
Substancja czynna	Diosminum

Opis produktu

Skład Diosminexu

1 tabletkę zawiera substancję czynną: zmikronizowana diosmina – 500mg oraz substancje pomocnicze: (rdzeń tabletki) celuloza mikrokryształiczna, laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian; (otoczka) talk, alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), makrogoł 3350, lak glinowy żółtocieniny chinolinowej (E104), lak glinowy indygotyny (E 132), lak glinowy żółtocieniny pomarańczowej (E110), żelaza tlenek czarny.

Jak działa Diosminex

Diosminex wspomaga aż 9 obszarów, które składają się na prawidłowe funkcjonowanie układu krwionośnego. Lek zwiększa napięcie naczyń żylnych, wytrzymałość układu kapilarnego, jak również opór włóscinek. Zmniejsza natomiast zastój żylny, rozszerzalność żył oraz przepuszczalność włóscinek. Ponadto działa ochronnie na naczynia, przyczynia się do poprawy przepływu w układzie chłonnym oraz wpływa na skrócenie czasu opróżniania naczynia żylnego. Za skuteczność leku odpowiada zawarta w nim substancja czynna – zmikronizowana diosmina, która przede wszystkim polepsza elastyczność naczyń żylnych. Dodatkowo działa ona przeciwozłonnie.

Zastosowanie Diosminexu

Lek Diosminex 0,5g przeznaczony do stosowania w leczeniu objawów towarzyszących niewydolności krążenia żylnego oraz limfatycznego, czyli uczucia ciężkości oraz bólu nóg, nocnych kurczów łydek. Diosminex może być stosowany również w leczeniu objawowym zastrzonych dolegliwości związanych z żylakami odbytu.

Informacje dodatkowe

Lek zawiera laktozę. U osób ze stwierdzoną nietolerancją niektórych cukrów zaleca się konsultację z lekarzem lub farmaceutą.

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na diosminę lub pozostałe składniki leku.

Działania niepożądane

Podczas stosowania produktu leczniczego Diosminex mogą wystąpić objawy niepożądane: zaburzenia żołądka i jelit (nudności,

wymioty, niestrawność, biegunka); zaburzenia ze strony układu nerwowego (zawroty i ból głowy, złe samopoczucie); zaburzenia skóry i tkanki podskórnej (pokrzywka, wysypka, świąd).

Jak dawkować Diosminex

Zwyczajowo zaleca się stosować dawkę dobową wynoszącą 2 tabletki, przyjmowaną w dwóch porcjach – jedna tabletko rano, jedna tabletko wieczorem. Tabletki należy zażywać podczas posiłków. W zastrzonych dolegliwościach związanych z żylakami odbytu lek przyjmować w dawce: 6 tabletek na dobę przez pierwsze cztery dni stosowania, następnie dawkę zredukować do 4 tabletek na dobę przez kolejne 3 dni.