

Dip Rilif żel 50g



Cena: 22,76 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	(0,03g)/g, 05g+0
Opakowanie	50 g (tub.)
Postać	żel
Producent	THE MENTHOLATUM COMPANY LTD
Rejestracja	Lek OTC
Substancja czynna	Ibuprofenum, mentholum

Opis produktu

Składniki:

Substancje czynne:

Ibuprofen 5%

Mentol 3%

Substancje pomocnicze:

Karbomer, glikol propylenowy, etanol 96%, diizopropanolamina, woda oczyszczona

Działanie:

Preparat do stosowania miejscowego. Ibuprofen należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (pochodna kwasu propionowego) o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym. Hamuje aktywność cyklooksygenazy prostaglandynowej (hamowanie syntezy eikozanoidów, zmniejszanie zawartości kwasu arachidonowego w granulocytach). Zastosowany miejscowo łagodzi ból, zmniejsza obrzęk i odczyn zapalny. Podany na skórę osiąga we krwi stężenie wynoszące około 5% wartości osiąganych po podaniu tej samej dawki doustnie, natomiast w tkankach chorobowo zmienionych w miejscu zastosowania osiąga stężenie terapeutyczne. Mentol działa miejscowo znieczulająco, a także powoduje miejscowe przekrwienie tkanek. Skojarzone działanie obu składników powoduje szybki efekt przeciwbólowy i przeciwzapalny po naniesieniu preparatu, który utrzymuje się przez kilka godzin.

Wskazania:

Bóle reumatyczne m.in. w reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS)

Bóle stawów spowodowane zmianami zapalnymi i zwyrodnieniowymi, m.in. bóle zwyrodnieniowe i choroby zwyrodnieniowe stawów

Bóle pleców, często powiązane z naciskiem uszkodzonych krążków międzykręgowych na sąsiadujące nerwy. Uciskowi towarzyszy duże, bolesne napięcie mięśni pleców

Lumbago (postrzał)

Bóle mięśniowe

Bóle w tkance włóknistej, ścięgnach i więzadłach

Bóle i obrzęk wskutek uszkodzeń powysiłkowych

Urazy stawów z naderwaniem więzadeł (skręcenia stawów)

Kontuzje sportowe

Sposób użycia:

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat:

Cienką warstwę żelu nałożyć na bolące miejsce i delikatnie wmasować aż do wchłonięcia preparatu. Jednorazowo należy stosować od 1 do 4 cm żelu.

Czynność powtarzać nie częściej niż 3 razy na dobę, zachowując co najmniej czterogodzinną przerwę. Nie należy stosować dawki większej niż zalecana.