

Dolgit krem 0,05 g/g 50g

Cena: 24,79 zł



Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	0,05 g/g
Opakowanie	50 g (tub.)
Postać	krem
Producent	DOLGIIET PHARMACEUTICALS
Rejestracja	Lek OTC
Substancja czynna	Ibuprofenum

Opis produktu

Składniki:

1 g kremu lub żelu zawiera 50 mg ibuprofenu.

Działanie:

Niesteroidowy lek przeciwzapalny, pochodna kwasu propionowego, o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Hamuje aktywność cyklooksygenazy prostaglandynowej (hamowanie syntezy eikozanoidów, zmniejszanie zawartości kwasu arachidonowego w granulocytach). Działa przeciwagregacyjnie na płytki krwi. Zastosowany miejscowo łagodzi ból, zmniejsza obrzęk i odczyn zapalny. Podany na skórę szybko wchłania się, dzięki czemu akumulacja układowa leku jest minimalna. Wykazuje dobrą penetrację do stawów, gdzie wywołuje silny efekt przeciwzapalny po około 30 min. Leczenie miejscowe i wspomagające zwyrodnieniowych chorób stawów, chorób reumatycznych stawów i kręgosłupa. Obrzęki i stany zapalne tkanek miękkich okołostawowych (zapalenie kaletki maziowej, ścięgien, pochewek ścięgniętych, więzadeł i torebki stawowej), sztywność barku, bóle mięśniowe, urazy powstałe na skutek uprawiania sportu (stłuczenia, skręcenia).

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na ibuprofen oraz na inne leki z grupy niesteroidowych przeciwzapalnych. Nadwrażliwość na substancje pomocnicze. Nie stosować na otwarte rany i błony śluzowe. Nie zaleca się stosowania w ciąży oraz w okresie karmienia piersią. Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 14 r.ż. Unikać kontaktu preparatu z oczami i błonami śluzowymi.

Sposób użycia:

Do stosowania miejscowego. Pasek kremu lub żelu (długości 4-10 cm) nakłada się i wciera 3-4 razy dziennie w miejsca chorobowo zmienione. W przypadku dużych krwiaków skręceń można rozpocząć stosowanie kremu pod opatrunkiem okluzyjnym. Penetracja substancji czynnej może być zwiększona przez jonoforezę (żel nanosi się pod katodę i prowadzi zabieg przez 15 min). W chorobach reumatycznych preparat stosuje się najczęściej przez 4 tyg., przy urazach powstałych na skutek uprawiania sportu - przez 2 tyg.