

# Duozial syrop 150 ml

Cena: 23,24 zł



## Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	(2, 5mg+58mg ca 2+)/5ml
Opakowanie	150 ml
Postać	syrop
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek OTC
Substancja czynna	calcii chloridum dihydricum, cetirizini dihydrochloridum

## Opis produktu

### Skład Duozial:

5 ml syropu zawiera 2,5 mg cetyryzyny dichlorowodorku oraz 58 mg jonów wapnia w postaci wapnia chlorku dwuwodnego. Pozostałe składniki to: sacharoza, potasu sorbinian, aromat waniliowy AR 0345 (diacetyl, etylu maślan, wanilina, glikol 1,2-propylenowy, woda), sukraloza, woda oczyszczona.

### Działanie Duozial:

DUOZINAL syrop działa na bazie cetyryzyny, która stanowi silnego i selektywnego antagonistę obwodowego receptora histaminowego H<sub>1</sub>. Zawiera również chlorek wapnia. Dzięki ich zawartości preparat przyczynia się do złagodzenia objawów uczuleniowych (np. kichania, swędzenia nosa, przekrwienia błony śluzowej nosa, zaczerwienienia i świądu oczu, łzawienia - towarzyszącym alergicznym stanom zapalnym śluzówki nosa, a także symptomów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki). DUOZINAL wykazuje właściwości przeciwalergiczne.

### Przeciwwskazania:

- nadwrażliwość na substancje składowe produktu

### Wskazania Duozial:

Zaleca się wykorzystywanie preparatu u osób dorosłych i dzieci od 2 roku życia w przypadku uczuleniowego zapalenia błony śluzowej nosa i przewlekłej idiopatycznej pokrzywki.

### Dawkowanie Duozial:

Stosować doustnie. Dzieciom w wieku 2-6 lat podawać 5 ml syropu x 2/24h. Dzieciom w wieku 6-12 lat podawać 10 ml syropu x 2/24h. U osób dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat stosować 20 ml syropu x 1/24h. Preparat należy stosować na 60 minut przed jedzeniem, , popijając dużą ilością płynu. Nie popijać napojami mlecznymi.