

Etopiryna Extra 0,25g+0,2g+0,05g, 20 tabl.



Cena: 15,65 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	250mg + 200mg + 50mg
Opakowanie	20 tabl.
Postać	tabletki
Producent	ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Rejestracja	
Substancja czynna	Acidum acetylsalicylicum, coffeinum, Paracetamolum

Opis produktu

Skład:

Substancje czynne leku w jednej tablecie: kwas acetylosalicylowy – 250mg, paracetamol – 200mg, kofeina – 50mg. Pozostałe składniki: skrobia kukurydziana; celuloza mikrokryształiczna; olej rycynowy uwodorniony; tlenek glinu, prażony.

Działanie:

Wieloskładnikowy produkt leczniczy Etopiryna Extra polecany jest ze względu na swoje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, które zapewnia kwas acetylosalicylowy oraz paracetamol. Ich działanie przeciwbólowe dodatkowo nasila zawarta w leku kofeina.

Zastosowanie:

Produkt leczniczy Etopiryna Extra wskazany do stosowania w przypadku bólu głowy, w tym bólu migrenowego, a także innych rodzajów bólów o umiarkowanym nasileniu, szczególnie o pochodzeniu zapalnym.

Informacje dodatkowe:

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Podczas stosowania leku nie wolno pić alkoholu.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku lub nadwrażliwości na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, której towarzyszy skurcz oskrzeli, nieżyt nosa, pokrzywka, wstrząs. Nie stosować u osób z astmą oskrzelową, przewlekłymi chorobami układu oddechowego, gorączką sienną lub obrzękiem błony śluzowej nosa. Nie stosować w przypadku: czynnej choroby wrzodowej żołądka i/lub dwunastnicy, stanów zapalnych lub krwawienia z przewodu pokarmowego; ciężkiej niewydolności wątroby, nerek lub serca; zaburzeń rytmu serca; bezsenności; zaburzeń krzepnięcia krwi (nie stosować także u osób leczonych jednocześnie środkami przeciwzakrzepowymi); pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej; pacjentów przyjmujących równocześnie metotreksat w dawkach 15 mg tygodniowo (lub większych). Nie stosować u kobiet w ciąży, kobiet karmiących piersią, u dzieci poniżej 16. roku życia.

Działania niepożądane:

Podczas stosowania leku u niektórych mogą wystąpić działania niepożądane: zaburzenia krwi i układu chłonnego: małopłytkowość, niedokrwistość wskutek mikrokrwawień z przewodu pokarmowego, niedokrwistość hemolityczna u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej, leukopenia, agranulocytoza, eozynopenia, methemoglobinemia, trombocytopenia, zwiększone ryzyko krwawień, wydłużenie czasu krwawienia, wydłużenie czasu protrombinowego; zaburzenia układu immunologicznego: reakcje nadwrażliwości: świąd, wysypka, pokrzywka, rumień, zespół Stevensa-Johnsona, obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, wstrząs; zaburzenia układu nerwowego: ból głowy, bezsenność; zaburzenia oka: zaburzenia widzenia; zaburzenia ucha i błędnika: szumy uszne, zaburzenia słuchu, zawroty głowy, odwracalna utrata słuchu, szum i dzwonięcie w uszach są pierwszymi objawami zatrucia salicylanami; zaburzenia serca i zaburzenia naczyniowe: obrzęki, nadciśnienie, niewydolność serca; zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: obrzęk płuc pochodzenia pozasercowego, skurcz oskrzeli u pacjentów z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne; zaburzenia żołądka i jelit: niestrawność, zgaga, uczucie pełności lub pieczenia w nadbrzuszu, nudności, wymioty, biegunka, brak łaknienia, bóle brzucha, krwawienia z przewodu pokarmowego, uszkodzenie błony śluzowej żołądka, uczynnienie choroby wrzodowej, perforacje, zapalenie trzustki, owrzodzenie żołądka występuje u 15% pacjentów długotrwale przyjmujących kwas acetylosalicylowy; zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: ogniskowa martwica komórek wątrobowych, tkliwość i powiększenie wątroby (szczególnie u pacjentów z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów, toczeniem rumieniowatym układowym, gorączką reumatyczną lub chorobą wątroby w wywiadzie), przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy, fosfatazy alkalicznej i stężenia bilirubiny; zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wykwity skórne różnego rodzaju, świąd, rzadko pęcherze lub plamica, zgłaszano bardzo rzadkie przypadki ciężkich reakcji skórnych; zaburzenia nerek i dróg moczowych: białkomocz, obecność leukocytów i erytrocytów w moczu, nefropatia z martwicą brodawek nerkowych, śródmiąższowe zapalenie nerek, w przypadku przedawkowania: znaczne obniżenie klirensu kreatyniny lub ostra martwica kanalików nerkowych z zaburzeniami czynności nerek; zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: gorączka.

Dawkowanie:

Zaleca się stosować zgodnie z wytycznymi lekarza lub wskazówkami na ulotce. Przyjmować doustnie po posiłku, popijać dużą ilością wody. Dorośli, młodzież powyżej 16. roku życia: 1-2 tabletki 3 razy na dobę. Zaleca się stosować najmniejszą skuteczną dawkę preparatu. Maksymalna dawka dobową – 6 tabletek. Jest to lek do stosowania doraźnego, bez konsultacji z lekarzem nie stosować dłużej niż 3 dni, przy utrzymujących się objawach konieczna jest wizyta u lekarza.