

Euphrasia Hyalo 0,4% krople nawilżające



Cena: 12,96 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Opakowanie	10 ml
Postać	krople do oczu
Producent	NEXON PHARMA SP. Z O.O. SP.K.
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Składniki:

Hialuronian sodu BP 0,4%, biguanid poliheksametylenowy 0,0001% (jako konserwant), sterylna baza nawadniająca.

Działanie:

Preparat zapewnia szybki efekt nawilżenia i odświeżenia, ponadto działa kojąco, łagodzi podrażnienia oraz redukuje zaczerwienienia. Wyrób medyczny Euphrasia Hyalo 0,4% Nawilżające krople do oczu należy stosować w celu łagodzenia objawów podrażnienia, wysuszenia i przemęczenia wrażliwych oczu. Zapewnia natychmiastową ulgę zaczerwienionym, wrażliwym oczom i zmniejsza dyskomfort wywołany czynnikami zewnętrznymi. Preparat polecany jest m.in. przy zespole suchego oka i u osób, które noszą soczewki kontaktowe.

Zastosowanie:

Wyrób medyczny Euphrasia Hyalo 0,4% Nawilżające krople do oczu przeznaczony do stosowania przy objawach zespołu suchego oka (jest to stan, gdy łez jej za mało lub skład łez się zmienił), w przypadku: ekspozycji narządu wzroku na drażniące czynniki środowiskowe (centralne ogrzewanie, klimatyzacja, wiatr, dym, kurz, promieniowanie UV), noszenia soczewek kontaktowych wszystkich typów, długotrwałego oglądania telewizji, czytania, długotrwałej pracy przed ekranem monitora, telefonu, tabletu, długiej jazdy samochodem.

Informacje dodatkowe:

Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła. Nie stosować w przypadku, gdy opakowanie jest uszkodzone. Należy się skonsultować z okulistą w przypadku odczuwania dyskomfortu oka, podrażnienia, bólu, zaczerwienienia lub nieostrego widzenia. Po pierwszym otwarciu należy użyć w ciągu 90 dni.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Sposób użycia:

Aplikować 1-2 krople do każdego oka w razie potrzeby, chyba że lekarz zaleci inaczej. Po wkropleniu kropli należy zamrużyć kilka razy w celu rozprowadzenia preparatu na powierzchni oka. Po użyciu szczelnie zamknąć butelkę. Należy się skonsultować z lekarzem, jeśli

objawy nie ustępują.