

Flegamina Junior truskawkowym syrop 120 ml



Cena: 18,36 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	2 mg/5ml
Opakowanie	120 ml (but.)
Postać	syrop
Producent	TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
Rejestracja	Lek OTC
Substancja czynna	Bromhexinum

Opis produktu

Składniki:

Substancją czynną syropu Flegamina Junior o smaku truskawkowym jest bromoheksyny chlorowodorek. Pozostałe składniki to: kwas cytrynowy jednowodny, glukoza, glicerol, metyl parahydroksybenzoesan, aromat truskawkowy, koszenila w postaci 7,5% roztworu barwnika, woda oczyszczona.

Działanie:

Flegamina Junior syrop o smaku truskawkowym to skuteczny lek wykrztuśny upłynniający wydzielinę z dróg oddechowych. Swoje działanie zawdzięcza on substancji czynnej chlorowodoru bromoheksyny. Syrop Flegamina Junior o smaku truskawkowym ułatwia odkrztuszanie i oczyszczanie oskrzeli. Ma też działanie rozrzedzające na wydzielinę. Syrop Flegamina Junior posiada przyjemny dla dziecka smak truskawki.

Przeciwwskazania:

Stosować ostrożnie, jeśli u pacjenta występuje czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy. W przypadku wystąpienia zmian skórnych lub na błonach śluzowych, należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek Flegamina Junior o smaku truskawkowym może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób):

nudności, biegunka, wymioty,
ból w górnej części brzucha.

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):

wysypka,
nadwrażliwość.

Częstość nieznana:

ból głowy, zawroty głowy,

senność, skurcz oskrzeli,
pokrzywka, świąd, nadmierne pocenie się,
niestrawność,
obniżenie ciśnienia krwi,
zwiększona aktywność enzymów wątrobowych.

Sposób użycia:

Dzieci w wieku od 2 do 6 lat: 10 ml syropu Flegamina Junior o smaku truskawkowym (odpowiednik 2 łyżeczek do herbaty) 2 razy na dobę. Dzieci od 6 do 12 lat: 10 ml 3 razy na dobę. Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 20 ml syropu 3 razy na dobę. Syrop Flegamina Junior o smaku truskawkowym należy zażywać w równych odstępach czasu, po posiłku.