

# Flegamina o smaku malinowym syrop 200 ml



Cena: 30,92 zł

## Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	4 mg/5ml
Opakowanie	200 ml (but.)
Postać	syrop
Producent	TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
Rejestracja	Lek OTC
Substancja czynna	Bromhexinum

## Opis produktu

### Składniki:

5ml syropu zawiera substancję czynną: chlorowoderek bromheksyny – 4mg oraz substancje pomocnicze: kwas cytrynowy jednowodny, glukozę jednowodną, glicerol, propylu parahydroksybenzoesan, koszenilę, aromat malinowy, etanol 96%, wodę oczyszczoną.

### Działanie:

Lek wykrztuśny w postaci syropu o smaku malinowym. Jest to preparat mukolityczny, pomaga rozrzedzić wydzielinę w drogach oddechowych i przyspiesza jej usuwanie. Substancją czynną jest bromheksyna, która zwiększa wydzielanie śluzu, równocześnie zmniejszając jego lepkość, co powoduje upłynnienie zalegającej wydzieliny. Syrop pomaga oczyścić drogi oddechowe, przynosi ukojenie, ułatwia odkrztuszanie, nie zaburzając naturalnego odruchu kaszlu. Syrop Flegamina 4mg/5ml syrop smak malinowy to lek przeznaczony w ostrych i przewlekłych chorobach dróg oddechowych, przebiegających z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu.

### Informacje dodatkowe:

Lek zawiera alkohol. Zaleca się ostrożność w stosowaniu u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy oraz w przypadkach ciężkich zaburzeń czynności wątroby lub nerek. Ze względu na możliwość wystąpienia bólów i zawrotów głowy, a także senności może mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

### Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na bromheksynę lub którąkolwiek substancję zawartą w leku; nietolerancji niektórych cukrów. Nie należy stosować u dzieci poniżej 7. roku życia, ze względu na zawartość alkoholu nie zaleca się stosowania w pierwszym trymestrze ciąży oraz w okresie laktacji (przed ewentualnym zastosowaniem konieczna jest konsultacja lekarska).

### Działania niepożądane:

W trakcie przyjmowania leku, zwłaszcza długotrwałego, mogą wystąpić działania niepożądane: nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka, zmniejszenie ciśnienia krwi, senność, bóle i zawroty głowy oraz przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz (enzymów wątrobowych) w surowicy krwi. Rzadko mogą wystąpić reakcje alergiczne: wysypka, świąd oraz ciężkie reakcje alergiczne jak: reakcje anafilaktyczne, skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy (ciężka reakcja alergiczna powodująca obrzęk twarzy lub gardła

mogący utrudniać oddychanie).

**Sposób użycia:**

Do stosowania doustnego. Dzieci od 7. do 12. roku życia: podawać 5ml syropu (1 łyżka miarowa) 3 razy w ciągu doby. Dorośli i dzieci powyżej 12. roku życia: zażywać 10ml syropu (2 łyżki miarowe) 3 razy na dobę. Nie spożywać leku bezpośrednio przed snem.