

Foxill żel 1 mg/g 30g



Cena: 30,67 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	1 mg/g
Opakowanie	1 tub. po 30 g
Postać	żel
Producent	ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Rejestracja	Lek OTC
Substancja czynna	Dimetindenum

Opis produktu

Składniki:

1g żelu zawiera: 1mg dimetyndenu maleinianu (Dimetindeni maleas) oraz substancje pomocnicze: karbomer (typ 974 P), disodu edetynian, sodu wodorotlenek, glikol propylenowy, benzalkoniowy chlorek, woda oczyszczona.

Działanie:

Lek w postaci żelu zawierający dimetyndenu maleinian. Foxill żel 1mg/g to produkt leczniczy do stosowania miejscowego, który działa przeciwuczuleniowo, silnie przeciwświądowo. Dodatkowo zmniejsza obrzęk oraz łagodzi podrażnienie skóry delikatnie chłodząc ją w miejscu aplikacji. Żel działa miejscowo znieczulająco.

Zastosowanie:

Produkt leczniczy Foxill żel 1mg/g wskazany do stosowania w przypadku świądu, który towarzyszy dermatozom, pokrzywce, ukąszeniom owadów, a także oparzeniom słonecznym oraz powierzchownym oparzeniom skóry (oparzeniom pierwszego stopnia).

Informacje dodatkowe:

Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Żel zawiera glikol propylenowy oraz benzalkoniowy chlorek. Zaleca się chronić przed działaniem promieni słonecznych miejsca, które były smarowane żelem. U małych dzieci, kobiet w ciąży, matek karmiących nie zaleca się stosować na dużych obszarach skóry, zwłaszcza na zranienia i stany zapalne. Dodatkowo kobiety karmiące piersią nie powinny stosować leku w okolicach brodawek sutkowych.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku. Nie stosować w przypadku oparzeń skóry drugiego i trzeciego stopnia.

Działania niepożądane:

Podczas stosowania leku mogą wystąpić działania niepożądane. Najczęściej zgłaszanymi są: łagodne reakcje skórne o charakterze przemijającym w miejscu aplikacji żelu. Częstość nieznana: zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: uczucie pieczenia skóry, suchość,

alergiczne zapalenie skóry.

Sposób użycia:

Należy aplikować ciekłą warstwę żelu na skórę w miejscu zmienionym chorobowo, na swędzącej powierzchni skóry. Stosować 2-4 razy na dobę.