

Gaviscon o smaku mięty 300ml



Cena: 41,97 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	(0, 16g)/10ml, 267g+0, 5g+0
Opakowanie	300 ml (but.)
Postać	zawiesina doustna
Producent	RECKITT BENCKISER POLAND S.A.
Rejestracja	Lek OTC
Substancja czynna	calcii carbonas, natrii alginas, natrii hydrogencarbonas

Opis produktu

Gaviscon zawiesina 150 ml - skład:

Substancje czynne leku: alginian sodu, wodorowęglan sodu, węglan wapnia. 10ml zawiesiny zawiera 500mg alginianu sodu, 267mg wodorowęglanu sodu, 160mg węglanu wapnia oraz substancje pomocnicze: karbomer 974P, metylu parahydroksybenzoesan (E218) – 40mg/10ml i propylu parahydroksybenzoesan (E216) – 6mg/10ml, sacharyna sodowa, sodu wodorotlenek, aromat miętowy nr 4, aromat miętowy nr 5 oraz woda oczyszczona.

Gaviscon zawiesina 150 ml - działanie:

Skuteczność leku Gaviscon to efekt działania aż trzech składników czynnych – alginianu sodu, wodorowęglanu sodu oraz węglanu wapnia. Wskazaniem do stosowania preparatu są objawy refluksu żołądkowo-jelitowego. Zawarte w zawieszynie składniki szybko wchodzi w reakcję z kwasem solnym w żołądku, tworząc na powierzchni treści żołądkowej warstwę alginowego żelu o prawie obojętnym pH. W ten sposób lek hamuje refluks. W przypadku silnego refluksu cofnięciu ulega wyłącznie warstwa alginowego żelu, która w przełyka działa łągodoząco. Zawiesina ma przyjemny miętowy smak.

Gaviscon zawiesina 150 ml - zastosowanie:

Produkt leczniczy Gaviscon zawiesina wskazany do stosowania w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego (m.in. zgaga, odbijanie, niestrawność) odczuwanego po posiłku lub w czasie ciąży, a także objawów związanych z refluksowym zapaleniem przełyku. Można stosować w okresie ciąży i laktacji.

Gaviscon zawiesina 150 ml - informacje dodatkowe:

Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Lek nie zawiera laktozy i glutenu. Lek zawiera sód i wapń – należy zachować ostrożność u osób, które muszą uważać na podaż tych składników w diecie. Lek zawiera metylu parahydroksybenzoesan (E218) i propylu (E216) parahydroksybenzoesan – mogą one powodować wystąpienie reakcji alergicznej (w tym reakcje typu późnego).

Gaviscon zawiesina 150 ml - przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku.

Gaviscon zawiesina 150 ml - działania niepożądane:

Podczas stosowania mogą wystąpić działania niepożądane. Bardzo rzadko występujące działania niepożądane: reakcje alergiczne – wysypki skórne, świąd, trudności w oddychaniu, zawroty głowy, obrzęk twarzy, ust, języka lub gardła.

Gaviscon zawiesina 150 ml - dawkowanie:

Stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub zaleceniami na ulotce. Stosować doustnie. Przed użyciem należy wstrząsnąć buteleczką. Dawka dla osób dorosłych, w tym osób w podeszłym wieku, a także dzieci powyżej 12. roku życia: przyjmować 10-20ml po posiłku oraz przed snem, stosować do czterech razy na dobę. Dawkę dla dzieci poniżej 12. roku życia ustala lekarz. W przypadku, gdy objawy nie ustępują po 7 dniach stosowania, należy skonsultować się z lekarzem.