

Groprinosin Forte syrop 0,5g/5ml 150 ml

Cena: 38,59 zł



Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	0, 5 g/5ml
Opakowanie	150 ml (but.)
Postać	syrop
Producent	GEDEON RICHTER POLSKA SP.Z O.O.
Rejestracja	Lek OTC
Substancja czynna	Inosinum pranobexum

Opis produktu

Składniki:

Substancja czynna: inozyny pranobeks (Inosinum pranobexum). 1ml syropu zawiera 100mg inozyny pranobeksu oraz substancje pomocnicze: metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), maltitol ciekły (E 965) (maltitol, sorbitol), sacharyna sodowa (E 954), sukraloza (E 955), sodu wodorotlenek, kwas cytrynowy jednowodny, woda oczyszczona, aromat malinowy L-144739 (cukry, glikol propylenowy, etanol, naturalne substancje aromatyzujące) oraz aromat malinowy 10721-31 (dietylu malonian, etylu octan, aldehyd octowy, trans-2 heksanal, beta-Damascenon, maltodekstryna skrobiowa, guma arabska).

Działanie:

Lek przeciwwirusowy i zwiększający odporność organizmu (lek pobudza czynność układu odpornościowego) w postaci syropu o smaku malinowym. Substancją czynną wykorzystaną w produkcie leczniczym Groprinosin Forte syrop jest inozyny pranobeks, który hamuje in vitro namnażanie wirusów z grupy Herpes.

Produkt leczniczy Groprinosin Forte syrop wskazany do stosowania wspomagająco w przypadku osób o obniżonej odporności przy nawracających infekcjach górnych dróg oddechowych; w leczeniu opryszki warg oraz skóry twarzy, która wywołana została przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex). Lek do stosowania wyłącznie w przypadku osób, u których w przeszłości rozpoznano zakażenie wirusem opryszki pospolitej.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku. Nie stosować u dzieci poniżej 1. roku życia. Nie stosować w przypadku występującego aktualnie napadu dny moczanowej (silny ból stawu z obrzękiem i zaczerwienieniem skóry lub w obrębie dużych stawów dochodzi do wystąpienia wysięku). Nie stosować w przypadku, gdy badania wykazały zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi.

Działania niepożądane:

Podczas stosowania leku u niektórych osób mogą wystąpić działania niepożądane. W przypadku każdego leku może wystąpić reakcja alergiczna, jednak w przypadku produktu leczniczego Groprinosin Forte ciężkie reakcje alergiczne występują bardzo rzadko. W przypadku wystąpienia następujących działań niepożądanych należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem: nagle pojawiający się świszczący oddech, trudności w oddychaniu, obrzęk powiek, twarzy, warg, wysypka lub świąd (zwłaszcza jeśli dotyczą całego ciała).

Inne działania niepożądane: bardzo często: zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi, zwiększenie stężenia kwasu moczowego w moczu; często: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi, bóle głowy, zawroty głowy, zmęczenie lub złe samopoczucie, nudności z wymiotami lub bez, dyskomfort w nadbrzuszu, świąd skóry, wysypka skórna (jako jedyny objaw), bóle stawów; niezbyt często: senność lub trudności w zasypianiu (bezsenna), biegunka, zaparcia, wielomocz (zwiększona ilość wydalanego moczu), nerwowość; częstość nieznana: ból w nadbrzuszu, obrzęk twarzy, warg, powiek lub gardła może powodować trudności w oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy), pokrzywka, reakcja alergiczna, nagła reakcja alergiczna dotycząca całego ciała (reakcja anafilaktyczna), wstrząs anafilaktyczny, zawroty głowy, zaczerwienienie skóry (rumień).

Sposób użycia:

Lek stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub według zaleceń na ulotce. Stosować doustnie. Syrop odmierzać miarką dołączoną do opakowania. Osoby dorosłe, osoby w podeszłym wieku: zalecana dawka dobową: 50mg/kg masy ciała na dobę (0,5ml syropu na 1kg masy ciała na dobę) zwykle 3g (30ml syropu) na dobę (podawana w 3-4 dawkach podzielonych). Maksymalna dobową dawką: 4g (40ml syropu). Dzieci powyżej 1. roku życia: zalecana dawka dobową: 50mg/kg masy ciała na dobę (0,5ml syropu na 1kg masy ciała na dobę) podawana w 3-4 równych dawkach podzielonych w ciągu doby. Schemat dawkowania: 10-14kg masy ciała: 3 x 2,5ml syropu, 15-20kg masy ciała: 3 x 2,5-3,5ml syropu, 21-30kg masy ciała: 3 x 3,5-5ml, 31-40kg masy ciała: 3 x 5-7,5ml syropu, 41-50kg masy ciała: 3 x 7,5-9ml syropu. Czas leczenia: zwykle 5-14 dni. Leczenie zaleca się kontynuować jeszcze 1-2 dni po ustąpieniu objawów. Jeśli po 5-14 dniach objawy nie ustępują lub się pogarszają, należy skonsultować się z lekarzem.