


Groprinosin syrop 0,05 g/ml 150ml



Cena: 30,42 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	0,05 g/ml
Opakowanie	150 ml
Postać	syrop
Producent	GEDEON RICHTER POLSKA SP.Z O.O.
Rejestracja	Lek OTC
Substancja czynna	Inosinum pranobexum

Opis produktu

Składniki:

Substancją czynną leku jest inozyny pranobeks (50 mg/ml).

Pozostałe składniki to: sacharoza, metylu parahydroksybenzoesan, pyłku parahydroksybenzoesan, woda oczyszczona, sacharyna sodowa, glicerol, etanol 96% oraz aromat malinowy L-144739 (cukier, glikol propylenowy, etanol, naturalna substancja zapachowa).

Wskazania:

- Zakażenia wirusami Herpes Simplex typu I i II – leczenie opryszczki zwykłej
- Zakażenie wirusem Herpes varicella-zoster – leczenie ospy wietrznej, półpaśca
- Wspomagająco przy zakażeniach wywołanych przez inne wirusy
- Profilaktycznie u osób z obniżoną odpornością

Działanie:

Groprinosin to kompleks, w skład którego wchodzi: inozyna, N,N-dimetylamino-2-propanol oraz kwas p-acetamidobenzoesowy. Mechanizm działania leku polega na nasileniu odporności komórkowej przez pobudzenie dojrzewania i różnicowania limfocytów T. Ponadto lek reguluje mechanizmy cytotoksyczności limfocytów T oraz komórek NIC, a także funkcjonowanie limfocytów supresorowych T8 oraz pomocniczych T4. Podnosi poziom przeciwciał IgG oraz powierzchniowych markerów dopełniacza. Zwiększa chemotaksję i fagocytozę komórek żernych oraz wydzielanie cytokin: IL-2 i IL-1. Nasila syntezę mRNA limfocytów oraz zwiększa sprawność procesu translacji z jednoczesnym hamowaniem syntezy wirusowego RNA.

Przeciwwskazania:

- Nadwrażliwość na pranobeks inozyny lub którykolwiek ze składników preparatu
- Hiperurykemia oraz napad dny moczanowej
- Ciąża i karmienie piersią (tylko za zgodą lekarza)

Sposób użycia:

Dawkowanie ustalone jest na podstawie masy ciała oraz zaawansowania choroby. W przypadku osób dorosłych - zalecana dawka wynosi 50 mg/kg masy ciała na dobę (1 ml syropu na 1 kg masy ciała na dobę), zwykle 3 g (czyli 60 ml syropu) na dobę, podawane w 3

lub 4 dawkach podzielonych. Dawka maksymalna wynosi 4 g syropu na dobę (czyli 80 ml syropu). W przypadku dzieci powyżej 1 roku życia - zalecana dawka wynosi 50 mg/kg masy ciała na dobę (1 ml syropu na 1 kg masy ciała na dobę) w 3 lub 4 równych podzielonych dawkach podawanych w ciągu doby. Leczenie zwykle trwa od 5 do 14 dni, lek należy przyjmować jeszcze 1-2 dni po ustąpieniu objawów chorobowych.