

Hascovir ® Pro krem 0,05 g/g 5 g

Cena: 17,85 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	1-3 dni robocze
Dawka	05 g/g, 50 mg/ g
Opakowanie	5 g
Postać	krem
Producent	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Rejestracja	Lék OTC
Substancja czynna	Aciclovirum
Zastosowanie	Opryszczka

Opis produktu

Przed zastosowaniem leku Hascovir ® Pro krem należy dokładnie zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjentów.

Lek Hascovir ® Pro krem zawiera substancję czynną acyklowir, która po zastosowaniu na skórę wykazuje silne działanie przeciw wirusowi opryszczki pospolitej Herpes simplex..

Lek Hascovir ® Pro krem jest stosowany w miejscowym leczeniu objawów opryszczki wargowej (tzw. zimna) oraz zmian opryszczkowych na twarzy, wywołanych przez wirusa opryszczki pospolitej Herpes simplex.

Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego, miejscowo na opryszczkę umiejscowioną na wargach lub twarzy.

Nie należy stosować na błony śluzowe np. jamy ustnej, oczu, narządów płciowych.

Należy zachować szczególną ostrożność, tak aby nie dopuścić do kontaktu preparatu z oczami.

Nie wolno stosować preparatu w leczeniu opryszczki narządów płciowych.

Właściwości

Wskazania

Lek Hascovir ® Pro krem jest stosowany w miejscowym leczeniu opryszczki wargowej oraz zmian opryszczkowych na twarzy, wywołanych przez wirusa opryszczki pospolitej (Herpes simplex).

Przeciwwskazania

Leku Hascovir ® Pro krem nie należy stosować jeśli:

- występuje nadwrażliwość na acyklowir lub walacyklowir,
- uczulenia na glikol propylenowy,
- uczulenia na

Nadwrażliwość na substancje czynną – acyklowir, walacyklowir oraz glikol propylenowy, alkohol cetostearylowy lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych produktu.

Działania niepożądane

Jak każdy lek Hascovir pro krem może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u każdej osoby ,która go stosuje.

- Często (występują u 1 do 10 osób na 100)- łagodne wysuszenie lub złuszczenie skóry.

Niezbyt często (występują u 1 do 10 osób na 1000): przemijające uczucie pieczenia lub mrowienia; swędzenie.

Rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10000): rumień; kontaktowe zapalenie skóry po zastosowaniu leku.

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 osoby na 10000): nagłe reakcje nadwrażliwości, w tym ciężkie, jak obrzęk naczynioruchowy.

Składniki

Substancja czynna:

1 g kremu zawiera 50 mg acyklowiru (Aciclovirum).

Substancje pomocnicze:

glikol propylenowy, poloxamer 407, alkohol cetostearylowy, sodu laurylosiarczan, parafina ciekła lekka, wazelina biała, woda oczyszczona.

Sposób użycia

Lek Hascovir® Pro należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza czy farmaceuty.

Lek W razie wątpliwości należy przeznaczony jest do stosowania miejscowego na skórę.

- Aby zapobiec przenoszeniu zakażenia na inne miejsca na skórze, należy umyć ręce przed i po zastosowaniu leku.
- Zmiany opryszczkowe i bezpośrednio ich okolice należy smarować niewielką ilością leku 5 razy na dobę (co 4 godziny). - Najlepiej rozpocząć leczenie w momencie wystąpienia pierwszych objawów zakażenia (uczucie swędzenia, pieczenia lub kłucia). Natychmiastowe zastosowanie leku w okresie nawrotu choroby może całkowicie zapobiec jej rozwojowi.
- Leczenie powinno trwać 5 dni. Jeżeli po tym czasie objawy nie ustąpią, leczenie można przedłużyć o kolejne 5 dni.
- Gdy po 10 dniach objawy chorobowe nie ustąpią, należy zgłosić się do lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

Ważne

- Lek Hascovir® Pro krem należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.
- Leku Hascovir® Pro krem nie należy stosować na błonę śluzową jamy ustnej ani do oczu, gdyż może to spowodować podrażnienia.
- Lek Hascovir pro krem zawiera glikol propylenowy, który może powodować podrażnienie skóry.
- Lek Hascovir pro krem zawiera alkohol cetostearylowy, który może powodować miejscową reakcję skórą (np. kontaktowe zapalenie skóry).
- **W okresie ciąży nie należy stosować żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!**

Bardzo ważna jest, w przypadku kobiet w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią ,konsultacja z lekarzem aby wyjaśnić wszystkie potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu.

- Stosowanie leku Hascovir pro krem w okresie ciąży jest dopuszczone jedynie w sytuacji, gdy lekarz uzna to za absolutnie konieczne, oraz w jego ocenie oczekiwane korzyści dla matki przeważają nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Tylko lekarz może ocenić stosunek ryzyka do korzyści w takim przypadku.
- Ponieważ Acyklowir przenika do mleka kobiety karmiącej, to przed zastosowaniem preparatu w okresie karmienia piersią, należy skonsultować się z lekarzem.

- Należy zachować ulotkę dołączoną do opakowania aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o tych lekach, które planuje się stosować.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
- Działania niepożądane można również zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Przechowywanie[^]

Lek należy przechowywać w temperaturze pokojowej oraz chronić od światła i wilgoci.

Lek należy przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Zawartość opakowania

To jest lek. Dla bezpieczeństwa należy stosować go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Producent

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej „HASCO-LEK S.A.
ul. Żmigrodzka 242 E
51-131 Wrocław