

Hitaxa Fast Junior 2,5 mg 10 tabl.

Cena: 20,55 zł



Opis słownikowy

| | |
|-------------------|---|
| Czas dostawy | 2-5 dni |
| Dawka | 2,5 mg, 5 mg |
| Opakowanie | 10 tabletek |
| Postać | tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej |
| Producent | ADAMED CONSUMER HEALTHCARE S.A. |
| Rejestracja | Lek OTC |
| Substancja czynna | Desloratadinum |

Opis produktu

Składniki:

Substancją czynną leku jest desloratadyna.

1 tabletkę zawiera 2,5 mg desloratadyny.

Substancje pomocnicze: polakrylina potasowa, kwas cytrynowy jednowodny, żelaza tlenek czerwony (E 172), magnezu stearynian, kroskarmeloza sodowa, aromat Tutti Frutti, płynny (zawiera również glikol propylenowy), aspartam (E 951), celuloza mikrokrystaliczna, mannitol (suszony rozpyłowo), potasu wodorotlenek (do ustalenia pH).

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Dzieci w wieku od 6 do 11 lat: 1 tabletkę ulegającą rozpadowi w jamie ustnej 1 raz na dobę.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 2 tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej 1 raz na dobę.

Nie stosować leku Hitaxa fast junior dłużej niż 10 dni bez konsultacji z lekarzem.

Działanie:

Hitaxa fast junior łagodzi objawy związane z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa.

Wskazania:

Lek Hitaxa fast junior stosuje się w leczeniu łagodnych objawów związanych z pokrzywką.

Przeciwwskazania:

jeśli pacjent ma uczulenie na desloratadynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, lub na loratadynę.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (u 1 na 10000 pacjentów):

trudności w oddychaniu,

świszczący oddech,

swędzenie,
pokrzyka i obrzęk,
wysypka,
kołatanie serca,
szybkie bicie serca,
ból brzucha,
nudności,
wymioty,
rozstrój żołądka,
zawroty głowy,
senność.

Częstość nieznana:
nietypowe zachowanie,
zachowanie agresywne,
zmiany w sposobie bicia serca,
zwiększenie masy ciała
zwiększony apetyt.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek Hitaxa fast junior w postaci tabletek ulegają rozpadowi w jamie ustnej.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Hitaxa fast junior należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek, bądź występują drgawki.

Lek zawiera aspartam, może być szkodliwy dla osób z fenylketonurią.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.