

Humana 1 Mleko początkowe HMO 750 g od 0m+



Cena: 59,90 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	1-3 dni robocze
Opakowanie	750 g
Postać	Proszek
Producent	HUMANA GMBH
Rejestracja	
Zastosowanie	Karmienie dziecka

Opis produktu

Humana 1 mleko początkowe w proszku jest przeznaczone do podawania dzieciom od urodzenia do 6. miesiąca życia.

Formuła Humana 1 jest mlekiem początkowym do stosowania od urodzenia i jest przeznaczona dla niemowląt, które nie są karmione piersią. Może być stosowana również jako uzupełnienie karmienia piersią

Mleko początkowe Humana 1 zawiera **DHA*** (kwas dokozaheksaenowy), zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi wszystkich mlek początkowych.

Od ponad 65 lat wspieramy Mamy i dzieci w żywieniu na każdym etapie rozwoju. Humana 1 to nasz najbardziej zaawansowana formuła w historii mlek Humana.

Karmienie piersią to najlepsza metoda żywienia dla Twojego dziecka. Skonsultuj się z pediatrą lub położną, jeśli chcesz podawać dziecku mleko początkowe.

Zalety

- dla dzieci od urodzenia do 6. miesiąca życia, które nie są karmione piersią
- jest wzbogacone o wszystkie niezbędne składniki odżywcze w ilościach dostosowanych do wieku,
- 1 opakowanie = 53 porcję po 100 ml.

Wskazania

Formuła Humana 1 jest mlekiem początkowym do stosowania od urodzenia do 6. miesiąca życia i jest przeznaczona dla niemowląt. Może stanowić uzupełnienie karmienia piersią lub służyć do wyłącznego karmienia od dnia narodzin.

Składniki

demineralizowana serwatka w proszku, oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, słonecznikowy), laktoza, odtłuszczone mleko w proszku, galaktooligosacharydy (z mleka), tłuszcz z ziaren palmowych, 2'-fukozylolaktoza, chlorek potasu, sole wapniowe kwasu ortofosforowego, cytrynian sodu, węglan wapnia, olej z mikroalg Schizochytrium sp., olej z Mortierella alpina, dwuwiniol cholicy, węglan magnezu, L-

tyrozyna, witamina C, inozytol, L-fenylalanina, L-tryptofan, cytrynian potasu, tauryna, nukleotydy (kwas cytydino- 5-monofosforowy, sole sodowe kwasu urydino-5'-fosforowego, kwas adenozylo-5'-monofosforowy, sole sodowe kwasu inozyno-5'-fosforowego, sole sodowe kwasu guanozylo-5'-fosforowego), diglicynian żelaza, siarczan cynku, witamina E, kwas pantotenowy, niacyna, tiamina, siarczan miedzi, siarczan manganu, witamina B6, witamina A, witamina D, ryboflawina, jodek potasu, kwas foliowy, witamina K, selenian sodu, biotyna, witamina B12.

Stosowanie

- Podane ilości są wartościami zbliżonymi i mogą się różnić ze względu na indywidualne potrzeby dziecka.
- Przygotowując mleko do spożycia należy stosować wyłącznie załączoną miarkę (1 płaska miarka zawiera ok. 4.5 g proszku).

Sposób przygotowania

Mleko modyfikowane należy przygotowywać zawsze ściśle przestrzegając wskazówek producenta, umieszczonych na opakowaniu. Nieprzestrzeganie instrukcji może mieć złe konsekwencje dla zdrowia dziecka.

1. Umyj ręce i wyparz naczynia potrzebne do przygotowania mleka. Wygotuj butelkę i smoczek w wodzie przez 10 minut.
2. Gotuj świeżą wodę pitną przez 5 minut; pozostaw do schłodzenia -do temperatury ok. 50°C.
3. Sprawdź tabelę żywienia na opakowaniu.
4. Wlej mniej więcej połowę uprzednio przegotowanej ciepłej wody do wygotowanej butelki.
5. Używaj wyłącznie załączonej miareczki.
6. Miarkę należy luźno ,bez ubijania , napełnić proszkiem. Nadmiar proszku zgarnąć do otwartego opakowania mleka.
7. Wsypać proszek do butelki z przegotowaną wodą. Zamknąć butelkę i energicznie wstrząsnąć.
8. Dodać pozostałą część wody i po zamknięciu butelki i energicznie wstrząsać do całkowitego rozpuszczenia proszku.
9. Następnie w kąpeli wodnej lub pod bieżącą wodą należy schłodzić pokarm do temperatury odpowiedniej do podania czyli 37 °C .

Ważne

- Przy przygotowaniu porcji mleka należy ściśle przestrzegać wskazówek producenta.
- Decydując się na stosowanie mleka modyfikowanego, należy zawsze uważnie czytać i przestrzegać instrukcji znajdującej się na opakowaniu.
- Niewłaściwe przygotowanie i przechowywanie może być szkodliwe dla zdrowia dziecka.
- Każdą porcję należy przygotować bezpośrednio przed podaniem.
- Nigdy nie należy używać niewykorzystanej porcji pokarmu ponownie .
- Niewypitą porcję mleka wylać bezpośrednio po skończonym posiłku.
- Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.

Ostrzeżenia

- Po skończonym karmieniu nie pozostawiać smoczka z resztą mleka w buzi dziecka.
- Nie zaleca się podgrzewania mleka w kuchence mikrofalowej ze względu na zagrożenie oparzeniem.

Niewłaściwe przygotowanie i przechowywanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.

Przechowywanie.

- Opakowanie zewnętrzne powinno być wyrzucone dopiero po całkowitym wykorzystaniu zawartości, ze względu na umieszczone na nim ważne informacje.
- Nie zaleca się przesypania mleka do innych pojemników.
- Produkt, przed użyciem i po otwarciu, powinien być przechowywany w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu.
- Nie przechowywać w lodówce.

Zawartość opakowania powinna być zużyta w ciągu 3 tygodni po otwarciu.

Wyprodukowano przez:

Humana GmbH,
Strückhauser Straße 64-68, 26939
Ovelgönne / Strückhausen

Wyprodukowano dla:
Humana Poland Sp. z o. o.,
Plac Konesera 6 lok. B3,
03-736 Warszawa