

# Ibufen Forte malina 100ml



Cena: 39,23 zł

## Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	0, 2 g/5ml
Opakowanie	100 ml (but.)
Postać	zawiesina doustna
Producent	ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Rejestracja	Lek OTC
Substancja czynna	Ibuprofenum

## Opis produktu

### Skład:

5 ml zawiesiny zawiera 200 mg ibuprofenu.

Pozostałe składniki: hypromeloza, guma ksantan, glicerol (E 422), sodu benzoesan (E 211), maltitol ciekły (E 965), sodu cytrynian, kwas cytrynowy jednowodny, sacharyna sodowa (E 954), sodu chlorek, aromat malinowy, woda oczyszczona.

### Działanie:

Lek ma postać zawiesiny, którą dzieci chętnie przyjmują i nie mają problemów z jej przelicykaniem (w przeciwieństwie do tabletek). Charakteryzuje się przyjemnym malinowym smakiem, zachęcającym maluchy do spożycia. Jego substancją czynną jest ibuprofenu - niesteroidowy lek przeciwzapalny. Działa on przeciwzapalnie i przeciwbólowo (łagodzi ból o przeciętnym i słabym nasileniu). Ponadto efektywnie obniża podwyższoną ciepłotę ciała.

### Przeciwwskazania:

- nadwrażliwość na składniki leku
- podawanie dzieciom o masie ciała mniejszej niż 10 kg (do 1 roku życia)
- zaburzenia krzepnięcia krwi
- wrzody żołądka i/albo dwunastnicy, bądź krwawienie z żołądka
- krawienie, mające związek ze stosowaniem NLPZ
- ciężka choroba wątroby, nerek bądź niewydolność serca
- ostatni trymestr ciąży
- jednoczesne przyjmowanie innych NLPZ
- krwawienie z naczyń mózgowych albo inne aktywne krwawienia
- ciężkie odwodnienie

### Wskazania:

Preparat zaleca się stosować u dzieci powyżej 12 mż. (o mc. większej niż 10 kg) w przypadku objawów infekcji górnych dróg

oddechowych, np. gorączki oraz bólów o różnej etiologii.

**Dawkowanie:**

Stosować doustnie.

Dzieciom w wieku 1-2 lat (10-12 kg): na początku podawać 2,5 ml. Później w razie potrzeby stosować 2,5 ml co 8 godzin. Nie podawać więcej niż 7,5 ml/24h.

Dzieciom w wieku 3-5 lat (13-19 kg): na początku podawać 2,5 ml. Później w razie potrzeby stosować 2,5 ml co 6 godzin. Nie podawać więcej niż 10 ml/24h.

Dzieciom w wieku 6-9 lat (20-29 kg): na początku podawać 5 ml. Później w razie potrzeby stosować 5 ml co 8 godzin. Nie podawać więcej niż 15 ml/24h.

Dzieciom w wieku 10-12 lat (30-39 kg): na początku podawać 5 ml. Później w razie potrzeby stosować 5 ml co 6 godzin. Nie podawać więcej niż 20 ml/24h.

Młodzieży od 12 roku życia oraz osobom dorosłym na początku podawać 5-10 ml. Później w razie potrzeby 5-10 ml co 6-8 godzin. Nie stosować więcej niż 30 ml/24h.